

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до першого збору 25 днів; період від першого до останнього збору 15 днів; ураженість борошнистою росою - 30 %, вірусними хворобами - 60%; пошкодження шкідниками - попелицею - 30 %, вміст сухої речовини у плоді - 15 %, вміст загального цукру - 12 %.

Закритий ґрунт

® 08025003 Євпраксія

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуша - Водиця"

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок короткий, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю одностатеві. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зрілості. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання зрілості форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 14,9 т/га; період від повних сходів до першого збору 46 днів; Вміст: сухої речовини у плоді - 7,4 %, загального цукру - 10,1 %.

Закритий ґрунт

09025002 Каріббіан Голд

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Листкова пластинка характеризується такими показниками: велика, слабка інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, слабка зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю одностатеві. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зрілості. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу яйцевидна, основний колір шкірки в період досягання зрілості форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі середній, колір оранжевий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 45 т/га; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 12 днів; ураженість антракнозом - 0,2 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 11 %, загального цукру - 5,5 %.

08025008 Має F1

Заявник: Клоз

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю одностатеві. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зрілості. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період досягання зрілості форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі середній за товщиною, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 6 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 95 днів; період плодоношення 60 днів; ураженість борошнистою росою - 0,5 %, бактеріозом - 1,5 %, антракнозом - 0,5 %, вірусними хворобами - 2%. Вміст: сухої речовини у плоді - 10 %, загального цукру - 18 %.

Закритий ґрунт

09025004 Міра F1

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна ураженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням жовтий. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період досягання білий, форма основи плеската, форма верхівки заокруглена, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 28 т/га; період від повних сходів до першого збору 65 днів; вміст загального цукру - 15 %.

09025003 Раймонд F1

Заявник:

Хазера Генетікс

Закритий ґрунт

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, сильна ураженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням жовтий. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу яйцевидна, основний колір шкірки в період досягання зелений, форма основи і верхівки заокруглена, смуги наявні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення відсутнє. М'якуш в поперечному розрізі середній, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 7 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 15 днів; ураженість борошнистою росю - 5 %, бактеріозом - 3 %, антракнозом - 2 %, вірусними хворобами - 4%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 9 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 8 %, загального цукру - 13 %.

08025010 Сітірекс F1

Заявник:

Клоз

Закритий ґрунт

Листкова пластинка характеризується такими показниками: за розміром від середньої до великої, слабка інтенсивність зеленого забарвлення, ураженість лопатей від слабкої до помірної, слабка зубчастість і помірна хвилястість країв. Черешок короткий, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зеленого. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром вузький, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання брудно-жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 6 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 10 днів; ураженість борошнистою росю - 0,3 %, бактеріозом - 1,0 %, антракнозом - 0,5 %, вірусними хворобами - 2%. Вміст: сухої речовини у плоді - 10 %, загального цукру - 18 %.

® 06025006 Шрек

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Степ, Лісостеп, Полісся

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна