

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна ураженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням жовтий. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період досягання білий, форма основи плеската, форма верхівки заокруглена, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 28 т/га; період від повних сходів до першого збору 65 днів; вміст загального цукру - 15 %.

09025003 Раймонд F1

Заявник:

Хазера Генетікс

Закритий ґрунт

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, сильна ураженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням жовтий. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу яйцевидна, основний колір шкірки в період досягання зелений, форма основи і верхівки заокруглена, смуги наявні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення відсутнє. М'якуш в поперечному розрізі середній, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 7 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 15 днів; ураженість борошнистою росою - 5 %, бактеріозом - 3 %, антракнозом - 2 %, вірусними хворобами - 4%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 9 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 8 %, загального цукру - 13 %.

08025010 Сітірекс F1

Заявник:

Клоз

Закритий ґрунт

Листкова пластинка характеризується такими показниками: за розміром від середньої до великої, слабка інтенсивність зеленого забарвлення, ураженість лопатей від слабкої до помірної, слабка зубчастість і помірна хвилястість країв. Черешок короткий, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зеленого. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром вузький, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання брудно-жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 6 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 10 днів; ураженість борошнистою росою - 0,3 %, бактеріозом - 1,0 %, антракнозом - 0,5 %, вірусними хворобами - 2%. Вміст: сухої речовини у плоді - 10 %, загального цукру - 18 %.

® 06025006 Шрек

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

Степ, Лісостеп, Полісся

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна