

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням жовтий. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період досягання білий, форма основи плеската, форма верхівки заокруглена, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 28 т/га; період від повних сходів до першого збору 65 днів; вміст загального цукру - 15 %.

## 09025003 Раймонд F1

Заявник:

Хазера Генетікс

## Закритий ґрунт

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, сильна інтенсивність зеленого забарвлення, сильна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю одностомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням жовтий. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу яйцевидна, основний колір шкірки в період досягання зеленій, форма основи і верхівки заокруглена, смуги наявні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення відсутнє. М'якуш в поперечному розрізі середній, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 7 кг/м<sup>2</sup>; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 15 днів; ураженість борошністою росю - 5 %, бактеріозом - 3 %, антракнозом - 2 %, вірусними хворобами - 4%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 9 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 8 %, загального цукру - 13 %.

## 08025010 Сітірекс F1

Заявник:

Клоз

## Закритий ґрунт

Листкова пластинка характеризується такими показниками: за розміром від середньої до великої, слабка інтенсивність зеленого забарвлення, вираженість лопатей від слабкої до помірної, слабка зубчастість і помірна хвилястість країв. Черешок короткий, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зеленій. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром вузький, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання брунатно-жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір зелений. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 6 кг/м<sup>2</sup>; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 10 днів; ураженість борошністою росю -0,3 %, бактеріозом - 1,0 %, антракнозом - 0,5 %, вірусними хворобами - 2%. Вміст: сухої речовини у плоді - 10 %, загального цукру - 18 %.

## ® 06025006 Шрек

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Селма"

## Степ, Лісостеп, Полісся

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна

вираженість лопатей, помірна зубчастість країв, слабка хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків вертикальне. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зеленій. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром вузький, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу видовжена, основний колір шкірки в період досягання зеленій, форма основи плеската, форма верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення відсутнє. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір кремовий. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кольору слонової кістки.

Загальний урожай 30-32 т/га; товарна урожайність - 28 т/га; товарних плодів від загального урожаю - 92 %; маса товарного плоду - 400 г; довжина товарного плоду - 20 см; діаметр товарного плоду - 7-10 см; період від повних сходів до першого збору 95 днів; період плодоношення 30 днів; ураженість борошнистою росю - 4 %, антракнозом - 0,2 %, вірусними хворобами - 2,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 4,4 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 26 %, загального цукру - 21 %. Транспорتابельність - 4,4 балів. Напрямок використання - універсальний.

## Кабачок

### Закритий ґрунт

#### 09026004 Ардендо 174

Заявник: Енза Заден Біхр Б.В.

Габітус рослини куцувий, галуження відсутнє. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір зеленій, форма попережного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний та плямистий, основна форма еліптична. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід середній за довжиною.

Товарний урожай 650 ц/га; вміст сухої речовини 4,5%; днів до досягання - 70.

#### ® 03026005 Аспірант

Заявник:

Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом куцова. Наявна мармуровість листкової пластинки. Основний колір молодого плоду зеленій, відсутня плямистість, форма - циліндрична. Основний колір стиглого плоду жовтий.

Товарний урожай - 547 ц/га, середня маса плоду - 600 г, вміст сухої речовини - 6,3 %, дегустаційна оцінка - 4,9 бали, днів до досягання - 38,

#### 08026002 Асма F1

Заявник:

Клоз

Габітус рослини куцувий, галуження відсутнє. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір білуватий і зеленій, форма попережного перерізу округла, крапчастість дифузна та плямиста, основна форма циліндрична. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий.

Товарний урожай 35 ц/га; вміст сухої речовини 9 %; днів до досягання - 40.

#### 09026002 Карізма F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

### Степ, Лісостеп, Полісся

### Степ, Лісостеп, Полісся