

вираженість лопатей, помірна зубчастість країв, слабка хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків вертикальне. Квітки за статтю однодомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зеленій. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром вузький, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу видовжена, основний колір шкірки в період досягання зеленій, форма основи плеската, форма верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення відсутнє. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір кремовий. Насінина вузько-еліптична за формою у поперечному розрізі, кольору слонової кістки.

Загальний урожай 30-32 т/га; товарна урожайність - 28 т/га; товарних плодів від загального урожаю - 92 %; маса товарного плоду - 400 г; довжина товарного плоду - 20 см; діаметр товарного плоду - 7-10 см; період від повних сходів до першого збору 95 днів; період плодоношення 30 днів; ураженість борошнистою росою - 4 %, антракнозом - 0,2 %, вірусними хворобами - 2,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 4,4 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 26 %, загального цукру - 21 %. Транспорتابельність - 4,4 балів. Напрямок використання - універсальний.

Кабачок

Закритий ґрунт

09026004 Ардендо 174

Заявник: Енза Заден Біхір Б.В.

Габітус рослини куцувий, галуження відсутнє. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір зеленій, форма попережного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний та плямистий, основна форма еліптична. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід середній за довжиною.

Товарний урожай 650 ц/га; вміст сухої речовини 4,5%; днів до досягання - 70.

® 03026005 Аспірант

Заявник: Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом куцова. Наявна мармуровість листкової пластинки. Основний колір молодого плоду зеленій, відсутня плямистість, форма - циліндрична. Основний колір стиглого плоду жовтий.

Товарний урожай - 547 ц/га, середня маса плоду - 600 г, вміст сухої речовини - 6,3 %, дегустаційна оцінка - 4,9 бали, днів до досягання - 38,

08026002 Асма F1

Заявник: Клоз

Габітус рослини куцувий, галуження відсутнє. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір білуватий і зеленій, форма попережного перерізу округла, крапчастість дифузної та плямиста, основна форма циліндрична. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий.

Товарний урожай 35 ц/га; вміст сухої речовини 9 %; днів до досягання - 40.

09026002 Карізма F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Габітус рослини кущовий, галуження наявне. Молодий плід характеризується такими ознаками: від середнього до довгого за довжиною, середній за діаметром, шийка наявна, колір білуватий, форма поперечного перерізу куста, плямистість наявна, тип плямистості тільки дифузний, основна форма булавоподібна. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід довгий.

Вміст сухої речовини 8%; днів до досягання - 44; товарний урожай - 110 ц/га; антракноз 3 %; фузаріоз 3%.

09026001 Карамболь F1

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Габітус рослини кущовий, наявне помірне галуження. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір білуватий і жовтий, форма поперечного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний, основна форма циліндрична. Основний колір стиглого плоду - зелений. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід дуже короткий.

Товарний урожай 4,6 ц/га; вміст сухої речовини 10%; днів до досягання - 46; борошниста роса 1 %; антракноз 1 %; плямистість бактеріальна 1,5 %.

08026006 Сціллі F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Габітус рослини кущовий, галуження наявне. Молодий плід характеризується такими ознаками: середній за довжиною, діаметр середній, шийка наявна, колір зелений, форма поперечного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний та плямистий, основна форма поперечного перерізу округла, основна форма булавоподібна. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід середній за довжиною.

Товарний урожай 110 ц/га; днів до досягання - 40.

Кавун звичайний

® 07027002 Арсенал

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Плоїдність: диплоїд; маса плоду, (кг): від великої до дуже великої (6-7); форма поздовжнього розтину плоду: широко-еліптична; основний колір шкірки плоду: зелений; смуги плоду: наявні; ширина смуг плоду: середні; мармурова крапчастість плоду: наявна; колір м'якуша плоду: рожевий; основний колір оболонки сім'янки: червоний.

Загальний урожай 35,5 т/га; період від повних сходів до першого збору 90 днів; пошкодження шкідниками - попелицею, % 25; вміст сухої речовини в плоді, % 9,03; вміст загального цукру, % 6,45.

08027020 Бонта F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду середня, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середньої ширини смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ