

Габітус рослини кущовий, галуження наявне. Молодий плід характеризується такими ознаками: від середнього до довгого за довжиною, середній за діаметром, шийка наявна, колір білуватий, форма поперечного перерізу куста, плямистість наявна, тип плямистості тільки дифузний, основна форма булавоподібна. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід довгий.

Вміст сухої речовини 8%; днів до достигання - 44; товарний урожай - 110 ц/га; антракноз 3 %; фузаріоз 3%.

09026001 Карамболь F1

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Габітус рослини кущовий, наявне помірне галуження. Молодий плід характеризується такими ознаками: розмір і діаметр середні, шийка відсутня, колір білуватий і жовтий, форма поперечного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний, основна форма циліндрична. Основний колір стиглого плоду - зелений. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід дуже короткий.

Товарний урожай 4,6 ц/га; вміст сухої речовини 10%; днів до достигання - 46; борошниста роса 1 %; антракноз 1 %; плямистість бактеріальна 1,5 %.

08026006 Сціллі F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Габітус рослини кущовий, галуження наявне. Молодий плід характеризується такими ознаками: середній за довжиною, діаметр середній, шийка наявна, колір зелений, форма поперечного перерізу округла, плямистість наявна, тип плямистості дифузний та плямистий, основна форма поперечного перерізу округла, основна форма булавоподібна. Основний колір стиглого плоду - кремовий. Колір крапчастої шкірки стиглого плоду білуватий. Плід середній за довжиною.

Товарний урожай 110 ц/га; днів до достигання - 40.

Кавун звичайний

® 07027002 Арсенал

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Плоїдність: диплоїд; маса плоду, (кг): від великої до дуже великої (6-7); форма поздовжнього розтину плоду: широко-еліптична; основний колір шкірки плоду: зелений; смуги плоду: наявні; ширина смуг плоду: середні; мармурова крапчастість плоду: наявна; колір м'якуша плоду: рожевий; основний колір оболонки сім'янки: червоний.

Загальний урожай 35,5 т/га; період від повних сходів до першого збору 90 днів; пошкодження шкідниками - попелицею, % 25; вміст сухої речовини в плоді, % 9,03; вміст загального цукру, % 6,45.

08027020 Бонта F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду середня, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середньої ширини смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння середній, початок достигання ранній.

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Загальний урожай 90 т/га; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 65 днів; Ураженість хворобами: борошнистою россою - 1,0 %, переноспорозом - 5,0 %, бактеріозом - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 %.

08027021 Бостон F1

Заявник: Ньюемс Б.В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за довжиною, широка, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та досягання середні.

Загальний урожай 70 т/га; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 10 днів; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 60 %.

09027014 Бостана F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Загальний урожай 50 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 3-5 днів; вміст сухої речовини - 7 %; вміст загального цукру - 10,5 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 10 %, антракнозом - 10 %.

09027013 ВДЛ 5003

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від великої до дуже великої, форма поздовжнього розрізу широко-еліптична. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Загальний урожай 60 т/га; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 5 днів; вміст сухої речовини - 7 %; вміст загального цукру - 10,5 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 10 %, борошнистою россою - 10 %.

09027006 Екстазі F1

Заявник: Хазера Генетікс

Сім'ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання пізній.

Товарний урожай 7,5 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 25 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 5 %, бактеріозом - 5,0 %, борошнистою россою - 3,0 %, антракнозом - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0 %.

09027003 Ерлі Саманта F1

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Степ, Лісостеп

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт