

Загальний урожай 90 т/га; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 65 днів; ураженість хворобами: борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 5,0 %, бактеріозом - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 3 %.

08027021 Бостон F1

Степ, Лісостеп

Заявник:

Нюнемс Б.В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за довжиною, широка, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та досягання середні.

Загальний урожай 70 т/га; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 10 днів; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 60 %.

09027014 Бостана F1

Закритий ґрунт

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу округла. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Загальний урожай 50 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 3-5 днів; вміст сухої речовини - 7 %; вміст загального цукру - 10,5 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 10 %, антракнозом - 10 %, борошнистою росою - 10 %.

09027013 ВДЛ 5003

Закритий ґрунт

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від великої до дуже великої, форма поздовжнього розрізу широко-еліптична. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Загальний урожай 60 т/га; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 5 днів; вміст сухої речовини - 7 %; вміст загального цукру - 10,5 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 10 %, борошнистою росою - 10 %, переноспорозом - 10 %.

09027006 Екстазі F1

Закритий ґрунт

Заявник:

Хазера Генетікс

Сім'ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання пізній.

Товарний урожай 7,5 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 25 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 5 %, бактеріозом - 5,0 %, борошнистою росою - 3,0 %, антракнозом - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0 %.

09027003 Ерлі Саманта F1

Закритий ґрунт

Заявник:

Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло довге. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого забарвлення. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - дуже велика. Переважає зелений колір шкірки, наявні дуже широкі смуги, відсутня мармурова крапчастість. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 5,3 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 75 днів; період плодоношення 12 днів; вміст сухої речовини - 13 %; вміст загального цукру - 15 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,5 %, борошністою росю - 1,5 %, переноспорозом - 1,0 %; вірусними хворобами - 1,0 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 2,0 %.

09027004 Ерлі Джитана F1

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло середньої довжини. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого кольору. Плоди округлої форми у поздовжньому розрізі, маса - від середньої до великої. Переважає жовтий колір шкірки, наявні смуги середнього розміру, наявна дуже слабка мармурова крапчастість. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 8 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 78 днів; період плодоношення 12 днів; вміст сухої речовини - 13 %; вміст загального цукру - 12,5 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,5 %, борошністою росю - 1,0 %, переноспорозом - 1,5 %; вірусними хворобами - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

09027005 Колумбія F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду середня, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та дозрівання ранні.

Загальний урожай 10,3 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 20 днів; вміст сухої речовини - 10 %; вміст загального цукру - 7 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 0,2 %, борошністою росю - 0,3 %.

08027010 Кароліна F1

Заявник: Клоз

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за довжиною та шириною, сіро-зеленого кольору. Маса плоду дуже велика, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість дуже слабкої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та дозрівання середній.

Загальний урожай 45 т/га; період від повних сходів до першого збору 69 днів; період плодоношення 15 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 8 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,5 %, борошністою росю - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

08027023 Кодак F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та дозрівання пізній.

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Закритий ґрунт