

Загальний урожай 7,5 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 85 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 5,0 %, борошнистою росою - 3,0 %, переноспорозом - 5,0 %, бактеріозом - 5,0 %, вірусними хворобами - 6,0 %.

Закритий ґрунт

09027002 Карнаката F1

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус кущовидний. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду дуже велика, форма подовженого розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість дуже слабкої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та досягання ранні.

Загальний урожай 5,6 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 85 днів; період плодоношення 11 днів; вміст сухої речовини - 14 %; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,0 %, антракнозом - 1,0 %, вірусними хворобами - 1,0 %, борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 1,0 %. Пошкодження шкідниками - попелицею - 1,0 %.

Закритий ґрунт

09027008 Капа F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Сім'ядолі вузько-еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду велика, форма подовженого розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні вузькі смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м'якуша плоду червоний. Початок цвітіння та досягання середні.

Загальний урожай 50 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; вміст сухої речовини - 8 %; вміст загального цукру - 10 %.

Степ, Лісостеп, Полісся

08027009 Медісон F1

Заявник: Клоз

Сім'ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду дуже велика, форма подовженого розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання середні.

Загальний урожай 50 т/га; період від повних сходів до першого збору 68 днів; період плодоношення 20 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 7 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,5 %, борошнистою росою - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

Степ, Лісостеп, Полісся

® 08027022 Макс Плюс

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма подовженого розрізу широко-еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість слабкої інтенсивності. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання середні.

Загальний урожай 40,6 т/га; період від повних сходів до першого збору 73 днів; період плодоношення 30 днів; вміст сухої речовини - 9,5 %; вміст загального цукру - 8,2 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 3,5 %.

Закритий ґрунт

® 08027005 Пестунчик

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду велика, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду пурпуровий. Початок цвітіння та досягання ранні.

Загальний урожай 14,7 т/га; період плодоношення 38 днів; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 4,2 %.

09027001 Призматика F1

Закритий ґрунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло довге. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого кольору. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - дуже велика. Переважає зелений колір шкірки, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість відсутня. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 6,6 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 12 днів; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,0 %, борошнистою росою - 1,0 %, переноспорозом - 1,0 %; вірусними хворобами - 1,0 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,0 %.

® 09027007 Сагі F1

Закритий ґрунт

Заявник: Хазера Генетікс

Сім'ядолі широко-еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання ранні.

Загальний урожай 7,5 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 85 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14,0 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 5 %, бактеріозом - 5,0 %, борошнистою росою - 3,0 %, антракнозом - 5 %, вірусними хворобами - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0 %.

09027012 Селебрейшн F1

Закритий ґрунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Сім'ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Загальний урожай 90 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 2 дні; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 12 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 10 %, борошнистою росою - 10 %, переноспорозом - 10 %.

08027008 Чарльстон грей

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Клоз

Сім'ядолі еліптичної форми, від середнього до великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від великої до дуже великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду білий, відсутні смуги, мармурова крапчастість сильної інтенсивності. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання середні.