

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця" 394

Сім'ядолі еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду велика, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду пурпуровий. Початок цвітіння та досягання ранні.

Загальний урожай 14,7 т/га; період плодоношення 38 днів; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 4,2 %.

### 09027001 Призматика F1

### Закритий ґрунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Диплоїд. Рослина кущова, головне стебло довге. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого кольору. Плоди еліптичної форми у поздовжньому розрізі, маса - дуже велика. Переважає зелений колір шкірки, наявні широкі смуги, мармурова крапчастість відсутня. М'якуш червоний, помірний за твердістю.

Загальний урожай 6,6 кг/м<sup>2</sup>; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 12 днів; вміст загального цукру - 14 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 1,0 %, борошнистою россою - 1,0 %, переноспорозом - 1,0 %; вірусними хворобами - 1,0 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,0 %.

### ® 09027007 Сагі F1

### Закритий ґрунт

Заявник: Хазера Генетікс

Сім'ядолі широко-еліптичної форми, середнього розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду зелений, наявні середні смуги, мармурова крапчастість відсутня. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання ранні.

Загальний урожай 7,5 кг/м<sup>2</sup>; період від повних сходів до першого збору 70 днів; період плодоношення 85 днів; вміст сухої речовини - 6,0 %; вміст загального цукру - 14,0 %. Ураженість хворобами: переноспорозом - 5%, бактеріозом - 5,0 %, борошнистою россою - 3,0 %, антракнозом - 5 %, вірусними хворобами - 5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0 %.

### 09027012 Селебрейшн F1

### Закритий ґрунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Сім'ядолі широко-еліптичної форми, великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, зеленого кольору. Маса плоду від середньої до великої, форма поздовжнього розрізу еліптична. Основний колір шкірки плоду жовтий, наявні середні смуги, мармурова крапчастість середньої інтенсивності. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння середній, початок досягання ранній.

Загальний урожай 90 т/га; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 2 дні; вміст сухої речовини - 9 %; вміст загального цукру - 12 %. Ураженість хворобами: антракнозом - 10 %, борошнистою россою - 10 %, переноспорозом - 10 %.

### 08027008 Чарльстон Грей

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Клоз

Сім'ядолі еліптичної форми, від середнього до великого розміру. Габітус рослини сланкий. Листкова пластинка середня за розміром, сіро-зеленого кольору. Маса плоду від великої до дуже великої, форма поздовжнього розрізу циліндрична. Основний колір шкірки плоду білий, відсутні смуги, мармурова крапчастість сильної інтенсивності. Колір м'якуша плоду рожевий. Початок цвітіння та досягання середні.



Загальний урожай 100 т/га; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 15 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 8 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,5 %, борошнистою росю - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

**Степ**

**® 07027003 Чумак**

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Плоїдність: диплоїд; маса плоду, (кг): велика (5,1-6); форма поздовжнього розтину плоду: округла; основний колір шкірки плоду: зелений; смуги плоду: наявні; ширина смуг плоду: середні; мармурова крапчастість плоду: наявна; колір м'якуша плоду: рожевий; основний колір оболонки сім'янки: кремовий.

Загальний урожай 36,5 т/га; період від повних сходів до першого збору 97 днів; пошкодження шкідниками - попелицею, % 8; вміст сухої речовини в плоді, % 10,41; вміст загального цукру, % 7,49.

**Капуста білоголова**

**Степ, Лісостеп, Полісся**

**08028015 Бреді F1**

Заявник: Клоз

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки широко-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 2,0. Вміст сухої речовини, % - 9,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 80,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 80. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

**08028032 Бурбон F1**

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт слабкий, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка нещільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 15,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, кг/м<sup>2</sup> - 9,7. Лежкість, балів - 2. Ураженість хворобами, %: бактеріозом судинним - 8,0.

**08028016 Гардіан F1**

Заявник: Клоз

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма