

Загальний урожай 100 т/га; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період плодоношення 15 днів; вміст сухої речовини - 11 %; вміст загального цукру - 8 %. Ураженість хворобами: бактеріозом - 1,5 %, борошнистою росю - 1,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %.

Степ

® 07027003 Чумак

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту оочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту оочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Плоїдність: диплоїд; маса плоду, (кг): велика (5,1-6); форма поздовжнього розтину плоду: округла; основний колір шкірки плоду: зелений; смуги плоду: наявні; ширина смуг плоду: середні; мармурова крапчастість плоду: наявна; колір м'якуша плоду: рожевий; основний колір оболонки сім'янки: кремовий.

Загальний урожай 36,5 т/га; період від повних сходів до першого збору 97 днів; пошкодження шкідниками - попелицею, % 8; вміст сухої речовини в плоді, % 10,41; вміст загального цукру, % 7,49.

Капуста білоголова

Степ, Лісостеп, Полісся

08028015 Бреді F1

Заявник: Клоз

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків горизонтальне, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки широко-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 2,0. Вміст сухої речовини, % - 9,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 80,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 80. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

08028032 Бурбон F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт слабкий, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка нещільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 15,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, кг/м² - 9,7. Лежкість, балів - 2. Ураженість хворобами, %: бактеріозом судинним - 8,0.

08028016 Гардіан F1

Заявник: Клоз

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками малий, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма

поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка нещільна.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст сухої речовини, % - 7,9. Вміст вітаміну С, мг% - 50. Вміст загального цукру, % - 4,1. Загальна урожайність, т/га - 110,0. Лежкість, балів - 6. Період від сівби до початку достигання, днів - 75. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 2, бактеріозом судинним - 2.

09028019 Грегоріан F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина за висотою від низької до середньої. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками від малого до середнього, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя від слабкої до помірної, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення від слабкої до помірної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі увігнута, інтенсивність забарвлення покривних листків від світлої до помірної, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 4,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 95,0. Лежкість, балів - 5. Період від сівби до початку достигання, днів - 70. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10,0, бактеріозом судинним - 10,0.

08028033 Гілсон F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б. В.

Закритий ґрунт

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків спрямоване догори, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка дуже щільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 15,0. Вміст вітаміну С, мг% - 25,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, кг/м² - 9,7. Лежкість, балів - 2. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 12,0, бактеріозом судинним - 15,0.

08028029 Колія F1

Заявник: Монсанто Холланд Б. В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення слабка. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 1,2-1,5. Вміст сухої речовини, % - 8,5-9,0. Вміст вітаміну С, мг% - 35-53. Вміст загального цукру, % - 2,95-4,1. Загальна урожайність, т/га - 120,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 165.

09028017 Кілатон F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Степ, Лісостеп, Полісся