

поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка нещільна.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст сухої речовини, % - 7,9. Вміст вітаміну С, мг% - 50. Вміст загального цукру, % - 4,1. Загальна урожайність, т/га - 110,0. Лежкість, балів - 6. Період від сівби до початку достигання, днів - 75. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 2, бактеріозом судинним - 2.

09028019 Грегоріан F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина за висотою від низької до середньої. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками від малого до середнього, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя від слабкої до помірної, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення від слабкої до помірної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі увігнута, інтенсивність забарвлення покривних листків від світлої до помірної, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 4,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 95,0. Лежкість, балів - 5. Період від сівби до початку достигання, днів - 70. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10,0, бактеріозом судинним - 10,0.

08028033 Гілсон F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків спрямоване догори, середнього розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки опуклий, пухирчастість зовнішнього листя слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка дуже щільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 15,0. Вміст вітаміну С, мг% - 25,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, кг/м² - 9,7. Лежкість, балів - 2. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 12,0, бактеріозом судинним - 15,0.

08028029 Колія F1

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листя помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення слабка. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 1,2-1,5. Вміст сухої речовини, % - 8,5-9,0. Вміст вітаміну С, мг% - 35-53. Вміст загального цукру, % - 2,95-4,1. Загальна урожайність, т/га - 120,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 165.

09028017 Кілатон F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 110,0. Лежкість, балів - 9. Період від сівби до початку достигання, днів - 135. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10,0, бактеріозом судинним - 10,0.

Закритий ґрунт

09028020 Кілагрег F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 40,0. Лежкість, балів - 3. Період від сівби до початку достигання, днів - 55. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10, бактеріозом судинним - 10.

® 09028030 Кіклоп F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка дуже щільна.

Загальна урожайність, т/га - 85,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 155. Ураженість хворобами, %:

бактеріозом слизистим - 3,0, бактеріозом судинним - 4,0.

® 05028010 Лазурна

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Рослина дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа сильна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки обернено-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст сухої речовини, % - 9,11. Вміст вітаміну С, мг% - 33,18. Вміст загального цукру, % - 5,04. Загальна урожайність, т/га - 64,6-94,4. Період від сівби до початку достигання, днів - 170. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 0,9, бактеріозом судинним - 10,1.