

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 110,0. Лежкість, балів - 9. Період від сівби до початку достигання, днів - 135. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10,0, бактеріозом судинним - 10,0.

Закритий ґрунт

09028020 Кілагрег F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки поперечно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 40,0. Лежкість, балів - 3. Період від сівби до початку достигання, днів - 55. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 10, бактеріозом судинним - 10.

® 09028030 Кіклоп F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка дуже щільна.

Загальна урожайність, т/га - 85,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 155. Ураженість хворобами, %:

бактеріозом слизистим - 3,0, бактеріозом судинним - 4,0.

® 05028010 Лазурна

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Рослина дуже висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа сильна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки обернено-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Вміст сухої речовини, % - 9,11. Вміст вітаміну С, мг% - 33,18. Вміст загального цукру, % - 5,04. Загальна урожайність, т/га - 64,6-94,4. Період від сівби до початку достигання, днів - 170. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 0,9, бактеріозом судинним - 10,1.