

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 13196010 Назва сорту: ФРАВЕР **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171328

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	прямий	1
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівки (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівки)	коротка	3
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	низька	3
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	низька	3
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівки (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівки (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 3	3
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	ознака не визначалась	0
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	ознака не визначалась	0
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	ознака не визначалась	0
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначалась	0
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	51,4	74,3	110,8
+/- до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	-33,4	-26	13,4
%	-39	-26	14
Вегетаційний період, днів	54	66	73
Стійкість до: бал			
Вилягання	8,5	9,0	8,7
Посухи	9,0	8,0	8,5
Стеблової іржі	7,5	9,0	8,0
Борошнистої роси	8,5	9,0	8,7
Перезимувало рослин, бал	9,0	8,5	6,5
Залистяність, %	41,9	48,8	45,2
Вміст сирого протеїну, %	19,8	19,2	19,0
Напрямок використання	кормовий	кормовий	кормовий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.