

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 18,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,5. Загальна урожайність, т/га - 45,0. Лежкість, балів - 5. Період від сівби до початку достигання, днів - 50. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,0, бактеріозом судинним - 1,0.

08028005 Рікшн F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: округла; за довжиною головки, (см): від короткого до середнього; за діаметром головки, (см): від малої до середньої; розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: від середнього до пізнього.

Загальна врожайність, т/га: 110. Період від сівби до початку достигання, днів 140, Вміст : сухої речовини, % 7,9, Вміст : загального цукру, % 4,1, Вміст : вітаміну С, мг % 50, Вміст : білка, % 1,5, Лежкість, балів 6.

08028014 Ранокі F1

Заявник: Клоз

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків спрямоване догори, середнього розміру, форма пластинки широкообернено-яйцеподібна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки обернено-яйцеподібна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків світла, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна.

Вміст білка, % - 1,5. Вміст сухої речовини, % - 8,0. Вміст вітаміну С, мг% - 50. Вміст загального цукру, % - 6,0. Загальна урожайність, т/га - 125,0. Лежкість, балів - 9. Період від сівби до початку достигання, днів - 140. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

06028016 Славанова

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Елітсортнасія"

Заявник: Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: піднесена; за довжиною головки, (см): довга; за діаметром головки, (см): велика; розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: середній.

Загальна врожайність, т/га: 45,0. Товарний урожай - 40 т/га. Період від сівби до початку достигання, днів 110, Вміст : сухої речовини, % 8,5, Вміст : загального цукру, % 4,3, Вміст : вітаміну С, мг % 58, Лежкість, балів 9. Транспорتابельність - 9 балів. Дружність достигання - 90 %. Щільність головки - 7 балів.

09028014 Санторіно 60 F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Рослина середньої висоти. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки попереочно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа помірна, колір з восковим нальотом синьо-зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Степ

Закритий ґрунт

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 35,0. Лежкість, балів - 3. Період від сівби до початку достигання, днів - 60. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,0, бактеріозом судинним - 1,0.

08028017 Сір F1

Заявник: Клоз

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 2,0. Вміст сухої речовини, % - 9,0. Вміст вітаміну С, мг% - 45,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 130,0. Лежкість, балів - 6,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 60. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

09028031 Соня F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки плескатої, пухирчастість зовнішнього листа від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом синьо-зелений, восковий наліт від помірного до сильного, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Загальна урожайність, т/га - 95,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 142. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 3,0, бактеріозом судинним - 4,0.

08028019 Сателіт F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: округла; за довжиною головки, (см): середня (16-20); за діаметром головки, (см): середня (16-25); розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: середній.

Загальна врожайність, т/га: 95,0. Період від сівби до початку достигання, днів 110, Вміст: сухої речовини, % 7,6, Вміст: загального цукру, % 4,3, Вміст: вітаміну С, мг % 48, Вміст: білка, % 1,5, Лежкість, балів 2.

® 09028029 Таргет F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків від спрямованого догори до піднесеного, великого розміру, форма пластинки попереочно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків від помірної до темної, внутрішнє забарвлення качана