

Вміст білка, % - 3,0. Вміст сухої речовини, % - 19,0. Вміст вітаміну С, мг% - 30. Вміст загального цукру, % - 4,0. Загальна урожайність, т/га - 35,0. Лежкість, балів - 3. Період від сівби до початку достигання, днів - 60. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,0, бактеріозом судинним - 1,0.

### 08028017 Сір F1

Заявник:

Клоз

### Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина низька за висотою. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, малого розміру, форма пластинки широкобернено-яйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа слабка, колір з восковим нальотом зелений, восковий наліт помірний, інтенсивність зеленого забарвлення помірна. Форма поздовжнього розрізу головки овальна, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка середня за щільністю.

Вміст білка, % - 2,0. Вміст сухої речовини, % - 9,0. Вміст вітаміну С, мг% - 45,0. Вміст загального цукру, % - 5,0. Загальна урожайність, т/га - 130,0. Лежкість, балів - 6,0. Період від сівби до початку достигання, днів - 60. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 1,5, бактеріозом судинним - 1,5.

### 09028031 Соня F1

Заявник:

Моравосід спол. с р.о.

### Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великого розміру, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки плескатої, пухирчастість зовнішнього листа від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом синьо-зелений, восковий наліт від помірного до сильного, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана білувате, головка середня за щільністю.

Загальна урожайність, т/га - 95,0. Лежкість, балів - 8. Період від сівби до початку достигання, днів - 142. Ураженість хворобами, %: бактеріозом слизистим - 3,0, бактеріозом судинним - 4,0.

### 08028019 Сателіт F1

Заявник:

Бейо Заден Б.В.

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: : Бейо Заден Б.В. Форма поздовжнього розрізу головки: округла; за довжиною головки, (см): середня (16-20); за діаметром головки, (см): середня (16-25); розміщення найбільшого діаметра голівки: в середині; ступінь покриття голівки: покрита; щільність голівки: щільна; час збиральної стиглості: середній.

Загальна врожайність, т/га: 95,0. Період від сівби до початку достигання, днів 110, Вміст : сухої речовини, % 7,6, Вміст : загального цукру, % 4,3, Вміст : вітаміну С, мг % 48, Вміст : білка, % 1,5, Лежкість, балів 2.

### ® 09028029 Таргет F1

Заявник:

Моравосід спол. с р.о.

### Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків від спрямованого догори до піднесеного, великого розміру, форма пластинки попереочно-широкоеліптична, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листа від дуже слабкої до слабкої, колір з восковим нальотом сіро-зелений, восковий наліт сильний, інтенсивність зеленого забарвлення від помірної до сильної. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, інтенсивність забарвлення покривних листків від помірної до темної, внутрішнє забарвлення качана