

Загальний урожай 28 т/га; днів до достигання 155; період плодоношення - 23 дні. Вміст: сухої речовини - 15,5 %; загального цукру - 5,2 %; вітаміну С - 29,1 мг%; білка - 21 %. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий - 3 %; бактеріоз судинний - 3 %.

Капуста червоноголова

08030007 Гарансі F1

Заявник: Клоз

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина дуже висока. Найбільший діаметр головки маленький. Зовнішні листки великого розміру, форма пластинки широкояйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, наявне зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, частково покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання середній.

Загальний урожай 120 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 140 днів; лежкість, балів 7. Вміст: сухої речовини - 8 %; загального цукру - 5,0 %; вітаміну С - 51 мг%; білка - 1,5 %.

® 09030005 Могікан F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина висока. Найбільший діаметр головки великий. Зовнішні листки великого розміру, форма пластинки широкообернено-яйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, наявне зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 80 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 158 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 2, бактеріоз судинний 3; лежкість, балів 8.

09030002 Нуріма F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки середнього розміру, форма пластинки округла, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, відсутнє зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, щільна, час розтріскування після достигання пізній.

Загальний урожай 75 т/га; період від повних сходів до початку достигання - 80 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 0,1, бактеріоз судинний 0,1; лежкість, балів 9. Вміст: сухої речовини - 8 %; загального цукру - 3,4 %; вітаміну С - 35 мг%; білка - 2,5 %.

08030013 Романов F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Найбільший діаметр головки середній. Зовнішні листки середнього розміру, форма пластинки широкояйцевидна, забарвлення (з восковим нальотом) фіолетове, відсутнє зелене забарвлення. Головка характеризується такими показниками: овальна форма поздовжнього розрізу, покрита, забарвлення покривних листків фіолетове, внутрішнє забарвлення фіолетове, середня за щільністю, час розтріскування після достигання середній.

Загальний урожай 9,6 кг/м²; період від повних сходів до початку достигання - 82 днів; ураженість хворобами, %: бактеріоз слизистий 13,0, бактеріоз судинний 14,0; лежкість, балів 2. Вміст: сухої речовини - 15,0 %; загального цукру - 6,0 %; вітаміну С - 24 мг%; білка - 4,0 %.