

Рослина за висотою середня. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, великі, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листка помірна, колір з восковим нальотом зелений, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, головка щільна, час розтріскування качана після дозрівання середній.

Загальна врожайність - 45 т/га, період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів, період плодоношення - 30 днів, вміст сухої речовини - 7,4 %, загального цукру 5,3 %, вітаміну С - 31 мг%, білка - 1,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 1%, бактеріоз судинний 1%.

Закритий ґрунт

09153002 Морама F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина висока. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками великий, положення зовнішніх листків піднесене, великі, форма пластинки округла, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листка слабка, колір з восковим нальотом сіро-зелений, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округла, форма основи у поздовжньому розрізі піднесена, забарвлення листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільна головка, час розтріскування качана після дозрівання пізній.

Загальна врожайність - 40 т/га, період від повних сходів до початку дозрівання - 110 днів, період плодоношення - 30 днів, вміст сухої речовини - 6,5 %, загального цукру 4,0 %, вітаміну С - 29,2мг%, білка - 1,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 1%, бактеріоз судинний 1%.

Степ, Лісостеп, Полісся

09153003 Меліса F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Рослина за висотою середня. Максимальний діаметр разом із зовнішніми листками середній, положення зовнішніх листків піднесене, середнього розміру, форма пластинки широкояйцевидна, профіль верхньої сторони пластинки увігнутий, пухирчастість зовнішнього листка сильна, колір з восковим нальотом зелений, інтенсивність забарвлення сильна, восковий наліт помірний. Форма поздовжнього розрізу головки округло-плеската, форма основи у поздовжньому розрізі рівна, забарвлення покривних листків зелене, інтенсивність забарвлення покривних листків помірна, внутрішнє забарвлення качана жовтувате, щільність головки середня, час розтріскування качана після дозрівання середній.

Загальна врожайність - 52 т/га, період від повних сходів до початку дозрівання - 80 днів, період плодоношення - 15 днів, вміст сухої речовини - 12,1 %, загального цукру 4,2 %; вітаміну С - 110 мг%, білка - 4,8 %. Ураженість хворобами: бактеріоз слизистий 9%, бактеріоз судинний 9%.

Капуста цвітна

Закритий ґрунт

09029008 Декстер F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна сильна пухирчастість. Головка середня за висотою і велика за діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час дозрівання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 35 т/га; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення 27 днів. Вміст: сухої речовини

- 7,9 %; загального цукру - 3,7 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 1,2%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,2 %, бактеріоз слизистий - 1%.

09029002 Кул F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок увігнутої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу еліптична, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час досягання в рекомендований період вирощування ранній.

Загальний урожай 35 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 45 днів; період плодоношення 5 днів. Вміст: сухої речовини - 10,5 %; загального цукру - 3 %; вітаміну С - 38 мг%; білка - 4,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 9 %.

08029009 Мехіко F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок еліптичної форми, опуклої форми поперечного перетину, наявна помірна пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу еліптична, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 9,7 кг/м². Вміст: сухої речовини - 15,0 %; загального цукру - 5 %; вітаміну С - 25 мг%; білка - 3,0%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 15 %, бактеріоз слизистий - 12 %.

09029007 Стабіліс F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Рослина висока. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 95 днів; період плодоношення 20 днів. Вміст: сухої речовини - 7,2 %; загального цукру - 4,7 %; вітаміну С - 115 мг%; білка - 1,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,5 %, бактеріоз слизистий - 1 %.

09029006 Таберна F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування пізній.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 105 днів; період плодоношення 30 днів. Вміст: сухої речовини - 6,9 %; загального цукру - 4,5 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 1,4%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,1 %; бактеріоз слизистий - 1 %.

08087010 Беронія

Квасоля овочева