

- 7,9 %; загального цукру - 3,7 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 1,2%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,2 %, бактеріоз слизистий - 1%.

09029002 Кул F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок увігнутої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу еліптична, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час досягання в рекомендований період вирощування ранній.

Загальний урожай 35 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 45 днів; період плодоношення 5 днів. Вміст: сухої речовини - 10,5 %; загального цукру - 3 %; вітаміну С - 38 мг%; білка - 4,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 9 %.

08029009 Мехіко F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок еліптичної форми, опуклої форми поперечного перетину, наявна помірна пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу еліптична, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 9,7 кг/м². Вміст: сухої речовини - 15,0 %; загального цукру - 5 %; вітаміну С - 25 мг%; білка - 3,0%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 15 %, бактеріоз слизистий - 12 %.

09029007 Стабіліс F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Рослина висока. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 95 днів; період плодоношення 20 днів. Вміст: сухої речовини - 7,2 %; загального цукру - 4,7 %; вітаміну С - 115 мг%; білка - 1,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,5 %, бактеріоз слизистий - 1 %.

09029006 Таберна F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування пізній.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 105 днів; період плодоношення 30 днів. Вміст: сухої речовини - 6,9 %; загального цукру - 4,5 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 1,4%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,1 %; бактеріоз слизистий - 1 %.

08087010 Беронія

Квасоля овочева