

- 7,9 %; загального цукру - 3,7 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 1,2%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,2 %, бактеріоз слизистий - 1%.

09029002 Кул F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок увігнутої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу еліптична, забарвлення білувате, горбкуватість помірна. Час досягання в рекомендований період вирощування ранній.

Загальний урожай 35 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 45 днів; період плодоношення 5 днів. Вміст: сухої речовини - 10,5 %; загального цукру - 3 %; вітаміну С - 38 мг%; білка - 4,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 9 %.

08029009 Мехіко F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок еліптичної форми, опуклої форми поперечного перетину, наявна помірна пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу еліптична, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 9,7 кг/м². Вміст: сухої речовини - 15,0 %; загального цукру - 5 %; вітаміну С - 25 мг%; білка - 3,0%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 15 %, бактеріоз слизистий - 12 %.

09029007 Стабіліс F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Рослина висока. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування середній.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 95 днів; період плодоношення 20 днів. Вміст: сухої речовини - 7,2 %; загального цукру - 4,7 %; вітаміну С - 115 мг%; білка - 1,5%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,5 %, бактеріоз слизистий - 1 %.

09029006 Таберна F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою. Листок плескатої форми поперечного перетину, наявна слабка пухирчастість. Головка середня за висотою і діаметром, форма поздовжнього перерізу округло-плеската, забарвлення білувате, горбкуватість незначна. Час досягання в рекомендований період вирощування пізній.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до початку плодоношення - 105 днів; період плодоношення 30 днів. Вміст: сухої речовини - 6,9 %; загального цукру - 4,5 %; вітаміну С - 110 мг%; білка - 1,4%. Ураженість хворобами: бактеріоз судинний - 0,1 %; бактеріоз слизистий - 1 %.

08087010 Беронія

Квасоля овочева

Заявник:

Монсанто Холланд Б.В.

Рослини сорту низькі з пізнім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотили відсутнє. Листки темно-зеленого кольору з помірно зморшкуватістю. Середній листочок великого розміру, має прямокутну форму з короткозагостреною верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білий колір і паруса, і крил та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – довгий з великою шириною посередині та має маленьке відношення ширини впоперек до відстані між швами, помірно зморшкувату текстуру поверхні бобу та слабе звуження в сухому стані.

Біб – зеленого кольору помірно інтенсивності без волокнистості, має опуклу форму вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та загострену верхівку (за виключенням гачка).

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове, має форму поздовжнього розтину від округлої до еліптичної, широко-еліптичною форму поперечного перерізу з середньою його шириною.

Колір насінини – білий зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – велика.

08087007 Пауліста

Заявник:

Монсанто Холланд Б.В.

Рослини сорту середньої висоти з середнім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотили відсутнє.

Листки дуже темно-зеленого кольору зі помірно зморшкуватістю. Середній листочок малий, має прямокутну форму з

вузькозагостреною верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться в листках.

Квітка має білий колір і паруса, і крил та великий розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – середньої довжини з малою шириною посередині, має округлу форму поперечного перерізу (через насінину) та маленьке відношення ширини впоперек до ширини всередині, гладеньку текстуру поверхні бобу та відсутнє або дуже слабе звуження в сухому стані.

Біб – темно-зеленого кольору з відсутньою волокнистістю, має увігнуту форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та форму верхівки від загостреної до тупої (за виключенням гачка).

Гачок – середньої довжини зі слабким його вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове, має форму поздовжнього розтину від округлої до еліптичної, округлу форму поперечного перерізу з малою його шириною.

Колір насінини – білий зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – мала.

08087009 Унідор