

**08032012 MS Vega F1**

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (до 10). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай (ц/га) - 22

**® 09032001 Добрина F1**

Заявник: Ларк Сидс Інтернешнл

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - середнє. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів - 17,0 ц/га, ураженість бактеріозом 8,0%, фузаріозом - 8,0%

**08032011 Марта F1**

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе. Положення листової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай (ц/га) - 22,33

**08032016 Меркур F1****Полісся, Лісостеп. Степ****Лісостеп, Степ.****Полісся, Лісостеп, Степ**

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - середнє. Волоть велика. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 210

**08032017 Сігнет F1**

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабке. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (до 10). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - довгий (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 220

**08032015 Харвест Голд F1**

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутня або дуже слабка. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів велика, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 230.

**08032010 Чугайстр**

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Полісся, Лісостеп, Степ.