

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - середнє. Волоть велика. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 210

08032017 Сігнет F1

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (до 10). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - довгий (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 220

08032015 Харвест Голд F1

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутня або дуже слаба. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (11-14 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів велика, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтувато-білий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай качанів (ц/га) - 230.

08032010 Чугайстр

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Полісся, Лісостеп, Степ.