

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - середнє, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - середнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (до 10). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довжиною (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай (ц/га) - 160, Ураженість хворобами, % : летючою сажкою - 1, пухирчастою сажкою - 0,3, фузаріозом - 1, бактеріозом - 0,3.

## 08034011 Белградо F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): від середнього до довгого (15-20); діаметр коренеплоду, (см): від середнього до великого; відношення діаметр/довжина коренеплоду: велике; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздов на поверхні коренеплоду: слабо виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): середній (31-50); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоєми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: велика; час досягання коренеплоду: середній; вміст каротину в коренеплоді: високий; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий.

Товарна урожайність 75,0 т/га, днів до досягання 110, Гниль суха (%) 3, Альтернаріоз (%) 3, Суха речовина, % 8, Загальний цукор, % 5.

## 08034002 Кантербьюрі F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): середній (11-15); діаметр коренеплоду, (см): від великого до дуже великого; відношення діаметр/довжина коренеплоду: середнє; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздов на поверхні коренеплоду: слабо виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): великий (51-60); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоєми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: середня; час досягання коренеплоду: від середнього до пізнього; вміст каротину в коренеплоді: середній; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий.

Товарна урожайність 78,0 т/га, днів до досягання 137, Гниль суха (%) 3, Альтернаріоз (%) 3, Суха речовина, % 8, Загальний цукор, % 5.

## 07034005 Карадек F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ. За довжиною коренеплід, (см): дуже довгий (більше 20); діаметр коренеплоду, (см): середній (3-6); відношення діаметр/довжина коренеплоду: мале; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздов на поверхні коренеплоду: помірно виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): великий (51-60); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоєми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: середня; час досягання коренеплоду: ранній; вміст каротину в коренеплоді: середній; загальний вміст цукру в коренеплоді: середній.

## Морква посівна

### Степ, Лісостеп, Полісся

### Степ, Лісостеп, Полісся

### Степ, Лісостеп, Полісся