Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - середнє, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середня. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - середнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (до 10). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довжиною (15-18 см). Тип зернини цукрова кукурудза, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Товарний урожай (ц/га) - 160, Ураженість хворобами, % : летючою сажкою - 1, пухирчастою сажкою - 0,3, фузаріозом - 1, бактеріозом - 0,3.

Морква посівна

08034011 Белградо F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): від середнього до довгого (15-20); діаметр коренеплоду, (см): від середнього до великого; відношення діаметр/довжина коренеплоду: велике; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздок на поверхні коренеплоду: слабо виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): середній (31-50); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоєми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: велика; час досягання коренеплоду: середній; вміст каротину в коренеплоді: високий; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий.

Товарна урожайність 75,0 т/га, днів до досягання 110, Гниль суха (%) 3, Альтернаріоз (%) 3, Суха речовина, % 8, Загальний цукор, % 5.

08034002 Кантербьюрі F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): середній (11-15); діаметр коренеплоду, (см): від великого до дуже великого; відношення діаметр/довжина коренеплоду: середнє; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздок на поверхні коренеплоду: слабо виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): великий (51-60); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоєми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: середня; час досягання коренеплоду: від середнього до пізнього; вміст каротину в коренеплоді: середній; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий.

Товарна урожайність 78,0 т/га, днів до досягання 137, Гниль суха (%) 3, Альтернаріоз (%) 3, Суха речовина, % 8, Загальний цукор, % 5.

07034005 Карадек F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмБХ

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмБХ. За довжиною коренеплід, (см): дуже довгий (більше 20); діаметр коренеплоду, (см): середній (3-6); відношення діаметр/довжина коренеплоду: мале; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздок на поверхні коренеплоду: помірно виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): великий (51-60); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоєми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: середня; час досягання коренеплоду: ранній; вміст каротину в коренеплоді: середній; загальний вміст цукру в коренеплоді: середній.

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Товарна урожайність 92,0 т/га, днів до досягання 130, Гниль суха (%) 0,7, Альтернاریоз (%) 3,4, Гниль біла (%) 0,9, Мокра бактеріальна гниль (%) 0,6, Суха речовина, % 9,7, Загальний цукор, % 5,7.

09034003 Каріні

Заявник: Бейо Заден Б.В.

СЛП

Розетка листків – від середньої до широкої. Листок за положенням у просторі прямий, довгий – разом із черешком до 50 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід короткий – до 10 см, діаметр від середнього до великого. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду тула. Колір верхніх коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення верхніх плеча. Борізки на поверхні від слабко до помірно виражених. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній – 31-50 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду від середньої до великої. Час досягання коренеплоду від середнього до пізнього. Альтернاریоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Загальний цукор, % - 5. Суха речовина, % - 8,0. Товарний урожай, 75 т/га.

08034023 Комет

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Розетка листків – середньої ширини. Листок за положенням у просторі прямий, середній – разом із черешком 31-40 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід за довжиною середній 11-15 см, діаметр середній 3-6 см Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір верхніх коренеплоду жовтий. Наявне антоціанове забарвлення верхніх плеча. Борізки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній – 31-50 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду велика. Час досягання коренеплоду середній.

Альтернاریоз, % - 5, гниль біла, % - 3, гниль суха, % - 3, загальний цукор, % - 6, мокра бактеріальна гниль, % - 3, суха речовина, % - 15. Днів до досягання - 110. Товарний урожай - 6,5 кг/м². Призначений для свіжого ринку та переробки на сік.

09034015 Маестро F1

Заявник: Вілморін

Ширина розетки листків середня, рослина пряма, середня. Розсіченість листка помірна, сильної інтенсивності зеленого забарвлення. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід за довжиною - 11-15 см, діаметром - 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі - вузькоподовжена. Форма плеча - плескато-округла, місце прикріплення листків піднесене, форма кінчика тула. Колір верхніх коренеплоду - оранжевий. Борізки на поверхні відсутні або дуже слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра великий - 51-60 %. Забарвлення серцевини та флоєми оранжеве, сильної інтенсивності. Надземна частина коренеплоду - мала.

Загальний вміст цукру, каротину, сухої речовини - високий. Відносний вміст моноцукрів до загального вмісту цукру - середній. Тенденція до стрлікування - слабка. Час досягання - пізній.

08034009 Майор F1

Заявник: Клоз

СЛП

Розетка листків – середня. Листок за положенням у просторі прямий, довгий – разом із черешком до 50 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду ледь