

Товарна урожайність 92,0 т/га, днів до досягання 130, Гниль суха (%) 0,7, Альтернаріоз (%) 3,4, Гниль біла (%) 0,9, Мокра бактеріальна гниль (%) 0,6, Суха речовина, % 9,7, Загальний цукор, % 5,7.

09034003 Каріні

Заявник: Бейо Заден Б.В.

СЛП

Розетка листків – від середньої до широкої. Листок за положенням у просторі прямий, довгий – разом із черешком до 50 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід короткий – до 10 см, діаметр від середнього до великого. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі трикутна, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду тула. Колір верхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення верхніх плеча. Борізки на поверхні від слабко до помірно виражених. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній – 31-50 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності. Маса коренеплоду від середньої до великої. Час досягання коренеплоду від середнього до пізнього. Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Загальний цукор, % - 5. Суха речовина, % - 8,0. Товарний урожай, 75 т/га.

08034023 Комет

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Розетка листків – середньої ширини. Листок за положенням у просторі прямий, середній – разом із черешком 31-40 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід за довжиною середній 11-15 см, діаметр середній 3-6 см Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плескато-округла. Місце прикріплення листків втиснуте. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір верхні коренеплоду жовтий. Наявне антоціанове забарвлення верхніх плеча. Борізки на поверхні слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра середній – 31-50 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності. Маса коренеплоду велика. Час досягання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 5, гниль біла, % - 3, гниль суха, % - 3, загальний цукор, % - 6, мокра бактеріальна гниль, % - 3, суха речовина, % - 15. Днів до досягання - 110. Товарний урожай - 6,5 кг/м². Призначений для свіжого ринку та переробки на сік.

09034015 Маестро F1

Заявник: Вілморін

Ширина розетки листків середня, рослина пряма, середня. Розсіченість листка помірна, сильної інтенсивності зеленого забарвлення. Антоціанове забарвлення черешка наявне. Коренеплід за довжиною - 11-15 см, діаметром - 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі - вузькоподовжена. Форма плеча - плескато-округла, місце прикріплення листків піднесене, форма кінчика тула. Колір верхні коренеплоду - оранжевий. Борізки на поверхні відсутні або дуже слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра великий - 51-60 %. Забарвлення серцевини та флоєми оранжеве, сильної інтенсивності. Надземна частина коренеплоду - мала.

Загальний вміст цукру, каротину, сухої речовини - високий. Відносний вміст моноцукрів до загального вмісту цукру - середній. Тенденція до стрлікування - слабка. Час досягання - пізній.

08034009 Майор F1

Заявник: Клоз

СЛП

Розетка листків – середня. Листок за положенням у просторі прямий, довгий – разом із черешком до 50 см, розсіченість помірна. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду ледь

загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду помірно виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду дуже великий – 60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду середня. Час досягання коренеплоду середній. Альтернатив, % - 2. Гниль суха, % - 1,5. Загальний цукор, % - 5. Мокра бактеріальна гниль, % - 2. Суха речовина, % - 8. Товарний урожай, 50 т/га.

Степ, Полісся, Лісостеп

08034012 Нерак F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): від середнього до довгого (15-20); діаметр коренеплоду, (см): середній (3-6); відношення діаметр/довжина коренеплоду: мале; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздки на поверхні коренеплоду: відсутні або дуже слабо виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): середній (31-50); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоеми (м'якуши): оранжеве; маса коренеплоду: середня; час досягання коренеплоду: середній; вміст каротину в коренеплоді: високий; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий. Товарна урожайність 75т/га, днів до досягання 119, Гниль суха (%) 3, Альтернатив, % 8, Загальний цукор, % 5.

СЛП

08034006 Нантіндо F1

Заявник: Клоз

Розетка листків – середня. Листок за положенням у просторі прямий, дуже довгий – разом із черешком від 50 см. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду великий – 51-60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності. Маса коренеплоду середня. Час досягання коренеплоду середній. Гниль суха, % - 1,5. Загальний цукор, % - 5. Мокра бактеріальна гниль, % - 2. Суха речовина, % - 7. Товарний урожай, 80-100 т/га.

СЛП

09034001 Невіс F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – від вузької до середньої. Листок за положенням у просторі прямий, – разом із черешком до 40 см, розсіченість від тонкої до помірної. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід від середнього до довгого – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Найвнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра від малого до середнього. Забарвлення серцевини оранжеве помірної інтенсивності до сильної. Маса коренеплоду мала. Час досягання коренеплоду пізній. Альтернатив, % - 3. Гниль суха, % - 3. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 7,4. Товарний урожай, 78 т/га.

СЛП

09034002 Напа F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий, середньої довжини – разом із черешком до 40 см, розсіченість