

загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду помірно виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду дуже великий – 60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності. Маса коренеплоду середня. Час досягання коренеплоду середній. Альтернативність, % - 2. Гниль суха, % - 1,5. Загальний цукор, % - 5. Мокра бактеріальна гниль, % - 8. Товарний урожай, 50 т/га.

Степ, Полісся, Лісостеп

08034012 Нерак F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. За довжиною коренеплід, (см): від середнього до довгого (15-20); діаметр коренеплоду, (см): середній (3-6); відношення діаметр/довжина коренеплоду: мале; колір поверхні коренеплоду: оранжевий; наявність боріздки на поверхні коренеплоду: відсутня або дуже слабо виражені; діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра, (%): середній (31-50); забарвлення серцевини коренеплоду: оранжеве; коренеплід забарвлення флоеми (м'якуші): оранжеве; маса коренеплоду: середня; час досягання коренеплоду: середній; вміст каротину в коренеплоді: високий; загальний вміст цукру в коренеплоді: високий.

Товарна урожайність 75т/га, днів до досягання 119, Гниль суха (%) 3, Альтернативність (%) 3, Суха речовина, % 8, Загальний цукор, % 5.

СЛП

08034006 Нантіндо F1

Заявник: Клоз

Розетка листків – середня. Листок за положенням у просторі прямий, дуже довгий – разом із черешком від 50 см. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у подовженому розрізі вузькоподовжена, форма плеча округла. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду великий – 51-60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності. Маса коренеплоду середня. Час досягання коренеплоду середній.

Гниль суха, % - 1,5. Загальний цукор, % - 5. Мокра бактеріальна гниль, % - 2. Суха речовина, % - 7. Товарний урожай, 80-100 т/га.

СЛП

09034001 Невіс F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – від вузької до середньої. Листок за положенням у просторі прямий, – разом із черешком до 40 см, розсіченість від тонкої до помірної. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід від середнього до довгого – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у подовженому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескате. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Наявне антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду слабо виражені. Діаметр серцевини коренеплоду відносно загального діаметра від малого до середнього. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності до сильної. Маса коренеплоду мала. Час досягання коренеплоду пізній.

Альтернативність, % - 3. Гниль суха, % - 3. Загальний цукор, % - 5,2. Суха речовина, % - 7,4. Товарний урожай, 78 т/га.

СЛП

09034002 Напа F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий, середньої довжини – разом із черешком до 40 см, розсіченість

груба. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескاته. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду ледве виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду малий – 21-30 %. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Маса коренеплоду мала. Час досягання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до досягання – 115. Загальний цукор, % - 5,1. Суха речовина, % - 7,2. Товарний урожай, 74 т/га.

09034002 Напа F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

СЛП

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий, середньої довжини – разом із черешком до 40 см, розсіченість груба. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескاته. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду ледве виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду малий – 21-30 %. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Маса коренеплоду мала. Час досягання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до досягання – 115. Загальний цукор, % - 5,1. Суха речовина, % - 7,2. Товарний урожай, 74 т/га.

08034018 Сукцес

Заявник: Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о

СЛП

Ширина розетки листків від середньої до широкої. Листок напівпрямий, довгий, розсіченість від помірно до грубої, помірно інтенсивного забарвлення. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – 16-20 см, середнього діаметру 3-6, вузькоподовженої форми. Відношення діаметру до довжини мале. Форма плеча коренеплоду округла, місце прикріплення листків плескате, форма кінчика загострена, колір - оранжевий. Антоціанове забарвлення поверхні плеча - відсутнє, розмір зеленого - малий. Наявність боріздов на поверхні плеча - слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра - від середнього до великого. Забарвлення серцевини порівняно з забарвленням мякуша - однакове. Надземна частина коренеплоду мала, маса коренеплоду від середньої до великої. Час досягання пізній. Вміст каротину, цукру високий, сухої речовини - середній.

Товарний урожай - 70 т/га. Днів до досягання - 150. Загальний цукор - 6,2 %, альтернаріоз - 7%, гниль біла - 5%, гниль суха - 1 %, мокра бактеріальна гниль - 8%. Суха речовина - 14%

08034010 Сатурно F1

Заявник: Клоз

СЛП

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий, середній – разом із черешком до 40 см. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча конічна. Місце прикріплення листків піднесене. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду великий – 51-60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності. Маса коренеплоду середня. Час досягання коренеплоду дуже ранній.