

груба. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескاته. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду ледве виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду малий – 21-30 %. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Маса коренеплоду мала. Час досягання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до досягання – 115. Загальний цукор, % - 5,1. Суха речовина, % - 7,2. Товарний урожай, 74 т/га.

09034002 Напа F1

СЛП

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий, середньої довжини – разом із черешком до 40 см, розсіченість груба. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча плеската. Місце прикріплення листків плескاته. Форма кінчика коренеплоду загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду ледве виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду малий – 21-30 %. Забарвлення серцевини оранжеве сильної інтенсивності. Маса коренеплоду мала. Час досягання коренеплоду середній.

Альтернаріоз, % - 3. Гниль суха, % - 3. Днів до досягання – 115. Загальний цукор, % - 5,1. Суха речовина, % - 7,2. Товарний урожай, 74 т/га.

08034018 Сукцес

СЛП

Заявник: Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о

Ширина розетки листків від середньої до широкої. Листок напівпрямий, довгий, розсіченість від помірно до грубої, помірно інтенсивного забарвлення. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – 16-20 см, середнього діаметру 3-6, вузькоподовженої форми. Відношення діаметру до довжини мале. Форма плеча коренеплоду округла, місце прикріплення листків плескате, форма кінчика загострена, колір - оранжевий. Антоціанове забарвлення поверхні плеча - відсутнє, розмір зеленого - малий. Наявність боріздок на поверхні плеча - слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра - від середнього до великого. Забарвлення серцевини порівняно з забарвленням мякуша - однакове. Надземна частина коренеплоду мала, маса коренеплоду від середньої до великої. Час досягання пізній. Вміст каротину, цукру високий, сухої речовини - середній.

Товарний урожай - 70 т/га. Днів до досягання - 150. Загальний цукор - 6,2 %, альтернаріоз - 7%, гниль біла - 5%, гниль суха - 1 %, мокра бактеріальна гниль - 8%. Суха речовина - 14%

08034010 Сатурно F1

СЛП

Заявник: Клоз

Розетка листків – вузька. Листок за положенням у просторі напівпрямий, середній – разом із черешком до 40 см. Антоціанове забарвлення черешка відсутнє. Коренеплід довгий – до 20 см, діаметр середній – 3-6 см. Форма коренеплоду у поздовжньому розрізі вузькоподовжена, форма плеча конічна. Місце прикріплення листків піднесене. Форма кінчика коренеплоду ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду оранжевий. Відсутнє антоціанове забарвлення поверхні плеча. Борізки на поверхні коренеплоду слабо виражені. Діаметр серцевини відносно загального діаметра коренеплоду великий – 51-60 %. Забарвлення серцевини оранжеве помірно інтенсивності. Маса коренеплоду середня. Час досягання коренеплоду дуже ранній.