

Огірок посівний

Закритий ґрунт

09035004 Акіліна

Заявник: Нюнемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість та хвилястість країв помірна. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, видовжено-циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення відсутнє або дуже незначне. Плямистість відсутня. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 120 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 50 днів. Ураженість пероноспорозом - 0,2 %; борошнистою росою - 0,3%; антракнозом - 0,2%; вірусними хворобами - 0,4%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,5%.

® 07035006 Бонус

Заявник: Приватний підприємець Медведєв Олександр Олександрович

Заявник: Приватний підприємець Медведєв Олександр Олександрович. Тип росту рослини: індетермінантний; інтенсивність зеленого забарвлення листка: помірна; хвилястість країв листків: слабка; вираження статі рослини: переважно жіночі квітки; забарвлення зав'язі: біле; партенокарпія: відсутня; форма плоду: циліндрична; за довжиною плід, (см): середній (11-20); за діаметром плід, (см): середній (2,1-3,5); плід: відношення довжина/діаметр: середнє; основне забарвлення паренхіми у фазі технічної стиглості: зелене; ребристість плоду: наявна; опушення плоду: відсутнє або дуже незначне; плід: горбочки: наявні; смужки плоду (за виключенням ребер): наявні; плямистість плоду: відсутня; основний колір шкірки плоду у фазі фізіологічної стиглості: жовтий; гіркота сім'ядолі: відсутня.

Загальна урожайність 30,0 т/га, Період від повних сходів до першого збирання 45 днів, Період плодоношення, днів 40, Вміст сухої речовини в плоді, % 4,1.

09035008 Гайдн F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Сила росту - сильна. Листок середнього розміру, пухирчастість та хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки наявні. Опушення густе. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність помірна. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 4,7 %. Загальна врожайність - 5 кг/м². Період від повних сходів до першого збирання - 37 днів. Період плодоношення - 30 днів. Ураженість пероноспорозом - 1,0 %; борошнистою росою - 1,0%; бактеріозом - 1,5 %; антракнозом - 2,0%; вірусними хворобами - 2,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 2,0%.

09035007 Джустіна

Заявник: Нюнемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Сила росту - слабка. Листок великого розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід короткий, жовтого кольору, овальної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення помірне. Плямистість відсутня.

Гіркота біля основи плоду відсутня.

Полісся, Лісостеп

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Вміст сухої речовини в плоді - 4 %. Загальна врожайність - 100 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 35 днів. Ураженість пероноспорозом - 0,5 %, бактеріозом - 0,2 %, антракнозом - 0,1 %, вірусними хворобами - 0,3 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,4 %.

09035009 Еколь F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки наявні. Опушення помірне. Пллямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 28 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 42 днів. Період плодоношення - 14 днів. Ураженість пероноспорозом - 10,0 %; антракнозом - 5,0%.

08035002 Еврика F1

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип росту рослини: індетермінантний; інтенсивність зеленого забарвлення листка: помірна; хвилястість країв листків: слабка; вираження статі рослини: чоловічих і жіночих квіток майже порівну; забарвлення зав'язі: біле; партенокарпія: відсутня; форма плоду: веретеноподібна; за довжиною плід, (см): короткий (6-10); за діаметром плід, (см): середній (2,1-3,5); плід: відношення довжина/діаметр: середнє; основне забарвлення паренхіми у фазі технічної стиглості: зелене; ребристість плоду: наявна; опушення плоду: відсутнє або дуже незначне; плід: горбочки: наявні; смужки плоду (за виключенням ребер): наявні; плямистість плоду: відсутня; основний колір шкірки плоду у фазі фізіологічної стиглості: оранжевий; гіркота сім'ядолі: наявна.

Загальна урожайність 30,1 т/га, Період від повних сходів до першого збирання 44 днів, Період плодоношення, днів 26, Ураженість хворобами, % : пероноспорозом 25, Вміст сухої речовини в плоді, % 5,1.

® 07035007 Забара

Заявник: Приватний підприємець Медведєв Олександр Олександрович

Лісостеп, Полісся

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість та хвилястість країв помірна. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, веретеноподібної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення відсутнє або дуже незначне. Пллямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гіркота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 4,3 %. Загальна врожайність - 50 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 38 днів. Період плодоношення - 30 днів. Ураженість пероноспорозом - 20 %.

® 09035016 Зузана F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середнього розміру, пухирчастість та хвилястість країв помірна. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі опушено-шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення помірне. Пллямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність помірна. Гіркота біля основи плоду відсутня.