

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 30 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 35 днів. Період плодоношення - 85 днів. Ураженість пероноспорозом - 15 %; борошнистою росою - 17%; бактеріозом - 9,0 %; антракнозом - 14%; вірусними хворобами - 6,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7,0%.

06035036 Калінка F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування. Тип росту рослини: індетермінантний; інтенсивність зеленого забарвлення листка: помірна; хвилястість країв листків: помірна; вираження статі рослини: чоловічих і жіночих квіток майже порівну; забарвлення зав'язі: біле; партенокарпія: відсутня; форма плоду: циліндрична; за довжиною плід, (см): короткий (6-10); за діаметром плід, (см): середній (2,1-3,5); плід: відношення довжина/діаметр: велике; основне забарвлення паренхіми у фазі технічної стиглості: зелене; ребристість плоду: наявна; опушення плоду: відсутнє або дуже незначне; плід: горбочки: наявні; смужки плоду (за виключенням ребер): відсутні; плямистість плоду: наявна; основний колір шкіри плоду у фазі фізіологічної стиглості: коричневий; гірота сім'ядолі: наявна.

Загальна урожайність 48,9 т/га, товарна врожайність 44 т/га, довжина товарного плоду 11 см. Період від повних сходів до першого збирання 42 днів, декустаційна оцінка 5 балів. Тривалість зберігання зеленого кольору у зеленці, днів 5.

09035015 Мертус F1

Закритий ґрунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середній за розміром, пухирчастість та хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості середня, горбочки наявні. Опушення незначне. Плямистість відсутня. Гірота біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 4,3 %. Загальна врожайність - 4,5 кг/м². Період від повних сходів до першого збирання - 30 днів. Період плодоношення - 35 днів. Ураженість пероноспорозом - 1,0 %; борошнистою росою - 1,0%; бактеріозом - 1,5 %; антракнозом - 2,0%; вірусними хворобами - 1,0%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 2,0%.

08035001 Приостерний

Полісся, Лісостеп

Заявник: Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету

Заявник: Ніжинський агротехнічний інститут Національного аграрного університету. Тип росту рослини: індетермінантний; інтенсивність зеленого забарвлення листка: слабка; хвилястість країв листків: помірна; вираження статі рослини: чоловічих і жіночих квіток майже порівну; забарвлення зав'язі: біле; партенокарпія: відсутня; форма плоду: циліндрична; за довжиною плід, (см): середній (11-20); за діаметром плід, (см): середній (2,1-3,5); плід: відношення довжина/діаметр: середнє; основне забарвлення паренхіми у фазі технічної стиглості: зелене; ребристість плоду: наявна; опушення плоду: відсутнє або дуже незначне; плід: горбочки: наявні; смужки плоду (за виключенням ребер): відсутні; плямистість плоду: відсутня; основний колір шкіри плоду у фазі фізіологічної стиглості: коричневий; гірота сім'ядолі: відсутня.

Загальна урожайність 50,0 т/га. Період від повних сходів до першого збирання 40 днів, Період плодоношення, днів 65, Ураженість хворобами, % : пероноспорозом 7, Вміст сухої речовини в плоді, % 4,2.

09035010 СГ 7258 F1

Закритий ґрунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.