

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок середнього розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки наявні. Опушення помірне. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гірка біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 6,0 %. Загальна врожайність - 31 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 25 днів. Ураженість пероноспорозом - 10 %; борошнистою росою - 10%; антракнозом - 10%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 10%.

09035005 Турмалін

Заявник: Нюнемс Б.В.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення густе. Плямистість наявна, плями маленькі округлі, інтенсивність слабка. Гірка біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 2,0 %. Загальна врожайність - 95 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 35 днів. Період плодоношення - 30 днів. Ураженість пероноспорозом - 0,5 %; борошнистою росою - 0,5%; бактеріозом - 0,3 %; антракнозом - 1,0%; вірусними хворобами - 0,2%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,7%.

® 09035017 Толстой F1

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Сила росту - слабка. Листок середнього розміру, пухирчастість помірна, хвилястість країв слабка. За вираженням статі рослини - майже виключно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Наявна партенокарпія. Плід середній, зеленого кольору, циліндричної форми. Ребристість наявна, ступінь ребристості слабкий, горбочки наявні. Опушення незначне. Плямистість відсутня. Гірка біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 5,0 %. Загальна врожайність - 25 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 60 днів. Період плодоношення - 95 днів. Ураженість пероноспорозом - 20 %; борошнистою росою - 15%; бактеріозом - 10 %; антракнозом - 12%; вірусними хворобами - 18%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0%.

09035006 Циркон

Заявник: Нюнемс Б.В.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Сила росту - середня. Листок великого розміру, пухирчастість слабка, хвилястість країв відсутня або дуже слабка. За вираженням статі рослини - переважно жіночі квітки. Поверхня зав'язі шипувата, забарвлення біле. Відсутня партенокарпія. Плід короткий, зеленого кольору, овальної форми. Ребристість відсутня, горбочки відсутні. Опушення помірне. Плямистість відсутня. Гірка біля основи плоду відсутня.

Вміст сухої речовини в плоді - 2,0 %. Загальна врожайність - 100 т/га. Період від повних сходів до першого збирання - 45 днів. Період плодоношення - 38 днів. Ураженість пероноспорозом - 1,0 %; борошнистою росою - 0,3%; бактеріозом - 0,5 %; антракнозом - 0,7%; вірусними хворобами - 0,5%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,0%.

Перець гіркий

09036001 Кампай F1

Закритий ґрунт

Заявник:

ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Сіянець з антоціановим забарвленням. Рослина напівпрямая, стебло коротке. Листок довгий, середній за шириною, зелений, з слабкою пухирчастістю. Плід пониклий, середній за довжиною, за досягання червоний, форма поздовжнього розрізу вузькотрикутна, форма верхівки заокруглена, плодоніжка середня за довжиною за товщиною.

Товарний урожай 40 ц/га, середня маса плоду 30 г, днів до досягання 70.

09036003 Тандер F1

Заявник:

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Сіянець з антоціановим забарвленням. Рослина пряма, стебло довге. Листок довгий, середній за шириною, зелений, з помірно пухирчастістю. Плід пониклий, дуже довгий, за досягання червоний, форма поздовжнього розрізу вузькотрикутна, форма верхівки загострена, плодоніжка довга, середня за товщиною.

Товарний урожай 8 ц/га, середня маса плоду 40 г, днів до досягання 85. Ураження хворобами: мозаїка зморшувата - 4 %, гниль верхівкова - 1,5 %, в'янення - 3,3 %.

Закритий ґрунт

Перець солодкий

09037011 Барбі F1

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилі паростка. Рослина напівпрямая за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глясуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня за товщиною. Час досягання середній.

Товарний урожай 425 ц/га, середня маса плоду 100 г; днів до досягання - 62; суха речовина 14,0%; загальний цукор 5,5%; вітамін С 150 мг/%; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 10,0 %. Товщина стінки плоду - 6 мм.

Закритий ґрунт

09037027 Відре F1

Заявник:

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилі паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, слабка глясуватість. Переважна кількість часток у плоді дві-три. М'якоть середня за товщиною. Час досягання ранній.

Товарний урожай 8,5 ц/га, середня маса плоду 70 г; днів до досягання - 115; суха речовина 10,0%; загальний цукор 4,0%; вітамін С 470 мг/%; клітковина 1,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,5 %, гниллю верхівковою - 5,5 %.

Закритий ґрунт

09037009 Діментіо F1

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилі паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині

Закритий ґрунт