

Заявник:

ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Сіянець з антоціановим забарвленням. Рослина напівпрямая, стебло коротке. Листок довгий, середній за шириною, зелений, з слабкою пухирчастістю. Плід пониклий, середній за довжиною, за досягання червоний, форма поздовжнього розрізу вузькотрикутна, форма верхівки заокруглена, плодоніжка середня за довжиною за товщиною.

Товарний урожай 40 ц/га, середня маса плоду 30 г, днів до досягання 70.

09036003 Тандер F1

Заявник:

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Сіянець з антоціановим забарвленням. Рослина пряма, стебло довге. Листок довгий, середній за шириною, зелений, з помірно пухирчастістю. Плід пониклий, дуже довгий, за досягання червоний, форма поздовжнього розрізу вузькотрикутна, форма верхівки загострена, плодоніжка довга, середня за товщиною.

Товарний урожай 8 ц/га, середня маса плоду 40 г, днів до досягання 85. Ураження хворобами: мозаїка зморшувата - 4 %, гниль верхівкова - 1,5 %, в'янення - 3,3 %.

Закритий ґрунт

Перець солодкий

09037011 Барбі F1

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилля паростка. Рослина напівпрямая за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня за товщиною. Час досягання середній.

Товарний урожай 425 ц/га, середня маса плоду 100 г; днів до досягання - 62; суха речовина 14,0%; загальний цукор 5,5%; вітамін С 150 мг/%; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 10,0 %. Товщина стінки плоду - 6 мм.

Закритий ґрунт

09037027 Відре F1

Заявник:

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, слабка глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді дві-три. М'якоть середня за товщиною. Час досягання ранній.

Товарний урожай 8,5 ц/га, середня маса плоду 70 г; днів до досягання - 115; суха речовина 10,0%; загальний цукор 4,0%; вітамін С 470 мг/%; клітковина 1,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,5 %, гниллю верхівковою - 5,5 %.

Закритий ґрунт

09037009 Діментіо F1

Заявник:

Сингента Сідз Б. В.

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотилля паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині

Закритий ґрунт

рослини) відсутнє. Листок зелений, довгий, широкий, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - круга. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 625 ц/га, середня маса плоду 120 г; суха речовина 14,0%; загальний цукор 6,5%; вітамін С 140 мг/100г; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 10,0 %. Днів до достигання - 65 балів. Товщина стінки плоду - 8 мм.

09037029 Злата

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Найване антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, короткий за довжиною, середній за шириною, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 800 ц/га, середня маса плоду 160 г; днів до достигання - 90; Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 2,0 %. Товщина стінки плоду - 6 мм.

08037005 Марадонна F1

Заявник: Монсантао Холланд Б.В.

Антоціанове забарвлення гіпокотили паростка відсутнє. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - круга. Структура поверхні плоду гладенька, колір - зеленувато-білий, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня. Час достигання середній.

Товарний урожай 350 ц/га, середня маса плоду 170-200 г; днів до достигання - 65; суха речовина 6,9-7,2%; загальний цукор 2,4%; вітамін С 76-114 мг/100г.

09037010 Мінтос F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Найване антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, слабка глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня за товщиною. Час достигання ранній.

Товарний урожай 525 ц/га, середня маса плоду 125 г; днів до достигання - 70; суха речовина 13,0%; загальний цукор 6,5%; вітамін С 160 мг/100г; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: антракнозом - 10,0 %, гниллю верхівковою - 10,0 %. Товщина стінки плоду - 8 мм.

09037026 Мазурка F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт