

рослини) відсутнє. Листок зелений, довгий, широкий, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - круга. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 625 ц/га, середня маса плоду 120 г; суха речовина 14,0%; загальний цукор 6,5%; вітамін С 140 мг/100г; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 10,0 %. Днів до достигання - 65 балів. Товщина стінки плоду - 8 мм.

09037029 Злата

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Найване антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, короткий за довжиною, середній за шириною, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 800 ц/га, середня маса плоду 160 г; днів до достигання - 90; Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 2,0 %. Товщина стінки плоду - 6 мм.

08037005 Марадонна F1

Заявник: Монсантао Холланд Б.В.

Антоціанове забарвлення гіпокотили паростка відсутнє. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - круга. Структура поверхні плоду гладенька, колір - зеленувато-білий, помірна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня. Час достигання середній.

Товарний урожай 350 ц/га, середня маса плоду 170-200 г; днів до достигання - 65; суха речовина 6,9-7,2%; загальний цукор 2,4%; вітамін С 76-114 мг/100г.

09037010 Мінтос F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Найване антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, слабка глянуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня за товщиною. Час достигання ранній.

Товарний урожай 525 ц/га, середня маса плоду 125 г; днів до достигання - 70; суха речовина 13,0%; загальний цукор 6,5%; вітамін С 160 мг/100г; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: антракнозом - 10,0 %, гниллю верхівковою - 10,0 %. Товщина стінки плоду - 8 мм.

09037026 Мазурка F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт