

рослини) відсутнє. Листок зелений, довгий, широкий, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, попережного перерізу (на рівні плаценти) - круга. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 625 ц/га, середня маса плоду 120 г; суха речовина 14,0%; загальний цукор 6,5%; вітамін С 140 мг/%; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 10,0 %. Днів до достигання - 65 балів. Товщина стінки плоду - 8 мм.

09037029 Злата

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Найване антоціанове забарвлення гіпокотила паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, короткий за довжиною, середній за шириною, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, попережного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час достигання середній.

Товарний урожай 800 ц/га, середня маса плоду 160 г; днів до достигання - 90; Ураження хворобами: гниллю верхівковою - 2,0 %. Товщина стінки плоду - 6 мм.

08037005 Марадонна F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Антоціанове забарвлення гіпокотила паростка відсутнє. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) наявне. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість помірна. Положення у просторі плоду поникле. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, попережного перерізу (на рівні плаценти) - круга. Структура поверхні плоду гладенька, колір - зеленувато-білий, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня. Час достигання середній.

Товарний урожай 350 ц/га, середня маса плоду 170-200 г; днів до достигання - 65; суха речовина 6,9-7,2%; загальний цукор 2,4%; вітамін С 76-114 мг/%.

09037010 Мінтос F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Найване антоціанове забарвлення гіпокотила паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, попережного перерізу (на рівні плаценти) - трикутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, слабка глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть середня за товщиною. Час достигання ранній.

Товарний урожай 525 ц/га, середня маса плоду 125 г; днів до достигання - 70; суха речовина 13,0%; загальний цукор 6,5%; вітамін С 160 мг/%; клітковина 1,5%. Ураження хворобами: антракнозом - 10,0 %, гниллю верхівковою - 10,0 %. Товщина стінки плоду - 8 мм.

09037026 Мазурка F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Відсутнє антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, довгий, середній за шириною, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - еліптична. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть товста. Час достигання середній.

Товарний урожай 9,5 ц/га, середня маса плоду 75 г; днів до достигання - 110; суха речовина 10,5%; загальний цукор 4,3%; вітамін С 480 мг%; клітковина 0,9%. Товщина стінки плоду - 4,2 мм. Ураження хворобами: антракнозом - 2,5 %, гниллю верхівковою - 5 %.

® 09037002 Сол F1

Заявник: Хазера Генетікс

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть товста. Час достигання середній.

Товарний урожай 7,56 ц/га, середня маса плоду 150 г; днів до достигання - 100; суха речовина 4,0%; загальний цукор 8,0%; вітамін С 12 мг%; клітковина 4,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 1,0 %, гниллю верхівковою - 1,0 %. Товщина стінки плоду - 5 мм.

10037003 Сондела F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за довжиною, вузький, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу прямокутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час достигання пізній.

Товарний урожай 8,5 ц/га, середня маса плоду 75 г; тривалість періоду до достигання - 110 діб; суха речовина 10,0%; загальний цукор 4,0%; вітамін С 470 мг%; клітковина 1,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,0 %, гниллю верхівковою - 4,9 %. Товщина стінки плоду - 4 мм.

® 09037003 Телестар F1

Заявник: Хазера Генетікс

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть товста. Час достигання пізній.

Товарний урожай 7,56 ц/га, середня маса плоду 1500 г; днів до достигання - 90; суха речовина 5,0%; загальний цукор 8,0%; вітамін С 14 мг%; клітковина 4,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,0 %, гниллю верхівковою - 1,0 %. Товщина стінки плоду - 5 мм.

® 08037002 Творець

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водича"

Закритий ґрунт