

Відсутнє антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, довгий, середній за шириною, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - еліптична. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть товста. Час достигання середній.

Товарний урожай 9,5 ц/га, середня маса плоду 75 г; днів до достигання - 110; суха речовина 10,5%; загальний цукор 4,3%; вітамін С 480 мг/%; клітковина 0,9%. Товщина стінки плоду - 4,2 мм. Ураження хворобами: антракнозом - 2,5 %, гниллю верхівковою - 5 %.

® 09037002 Сол F1

Заявник: Хазера Генетікс

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть товста. Час достигання середній.

Товарний урожай 7,56 ц/га, середня маса плоду 150 г; днів до достигання - 100; суха речовина 4,0%; загальний цукор 8,0%; вітамін С 12 мг/%; клітковина 4,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 1,0 %, гниллю верхівковою - 1,0 %. Товщина стінки плоду - 5 мм.

10037003 Сондела F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за довжиною, вузький, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу прямокутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час достигання пізній.

Товарний урожай 8,5 ц/га, середня маса плоду 75 г; тривалість періоду до достигання - 110 діб; суха речовина 10,0%; загальний цукор 4,0%; вітамін С 470 мг/%; клітковина 1,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,0 %, гниллю верхівковою - 4,9 %. Товщина стінки плоду - 4 мм.

® 09037003 Телестар F1

Заявник: Хазера Генетікс

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть товста. Час достигання пізній.

Товарний урожай 7,56 ц/га, середня маса плоду 1500 г; днів до достигання - 90; суха речовина 5,0%; загальний цукор 8,0%; вітамін С 14 мг/%; клітковина 4,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,0 %, гниллю верхівковою - 1,0 %. Товщина стінки плоду - 5 мм.

® 08037002 Творець

Заявник:

Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"