

Відсутнє антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, довгий, середній за шириною, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду пряме. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трикутна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - еліптична. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть товста. Час досягання середній.

Товарний урожай 9,5 ц/га, середня маса плоду 75 г; днів до досягання - 110; суха речовина 10,5%; загальний цукор 4,3%; вітамін С 480 мг%; клітковина 0,9%. Товщина стінки плоду - 4,2 мм. Ураження хворобами: антракнозом - 2,5 %, гниллю верхівковою - 5 %.

® 09037002 Сол F1

Заявник: Хазера Генетікс

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть товста. Час досягання середній.

Товарний урожай 7,56 ц/га, середня маса плоду 150 г; днів до досягання - 100; суха речовина 4,0%; загальний цукор 8,0%; вітамін С 12 мг%; клітковина 4,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 1,0 %, гниллю верхівковою - 1,0 %. Товщина стінки плоду - 5 мм.

10037003 Сондела F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за довжиною, вузький, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу прямокутна. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, помірна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть середня за товщиною. Час досягання пізній.

Товарний урожай 8,5 ц/га, середня маса плоду 75 г; тривалість періоду до досягання - 110 діб; суха речовина 10,0%; загальний цукор 4,0%; вітамін С 470 мг%; клітковина 1,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,0 %, гниллю верхівковою - 4,9 %. Товщина стінки плоду - 4 мм.

® 09037003 Телестар F1

Заявник: Хазера Генетікс

Наявне антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина пряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок темно-зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду поникле. Плід великий за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу трапецієвидна, поперечного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду гладенька, колір - червоний, сильна глянуватість. Переважна кількість часток у плоді чотири і більше. М'якоть товста. Час досягання пізній.

Товарний урожай 7,56 ц/га, середня маса плоду 1500 г; днів до досягання - 90; суха речовина 5,0%; загальний цукор 8,0%; вітамін С 14 мг%; клітковина 4,0%. Ураження хворобами: антракнозом - 2,0 %, гниллю верхівковою - 1,0 %. Товщина стінки плоду - 5 мм.

® 08037002 Творець

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водича"

Відсутнє антоціанове забарвлення гіпокотили паростка. Рослина напівпряма за положенням у просторі. Укорочення міжвузля (у верхній частині рослини) відсутнє. Листок зелений, середній за розміром, пухирчастість слабка. Положення у просторі плоду горизонтальне. Плід середній за діаметром, переважна форма поздовжнього розрізу квадратна, попережного перерізу (на рівні плаценти) - кругла. Структура поверхні плоду дуже зморшувата, колір - оранжевий, сильна глянсуватість. Переважна кількість часток у плоді три-чотири. М'якоть товста. Час достигання ранній.

Товарний урожай 14,6 ц/га, середня маса плоду 165 г; днів до достигання - 142; суха речовина 7,5%; загальний цукор 5,9%; вітамін С 200 мг/%; клітковина 1,6%. Товщина стінки плоду - 8 мм.

Петрушка городня

09163002 Атіка

Заявник: СЕМО а.с.

Коренева петрушка. Рослина висока, широка напівпряма з щільними листками. Кучерявість листової пластинки відсутня. Кількість листків - від середньої кількості до великої. Форма листка - вузько-трикутна. Глибина розрізу часток - велика. Середня кількість синусів краю листка. Черешок товстий з відсутнім або дуже слабким антоціаном. Корінь за довжиною від середнього до довгого, товстий, трикутної форми з слабким галуженням.

09163003 Арат

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Рослина середньої висоти та ширини, з рідкою щільністю листків. Кучерявість листової пластинки відсутня, без загнутих часток догори, листової пластинки довга, велика, кількість листків середня. Листкова пластинка з помірно інтенсивністю зеленого кольору. Форма листка - трикутна. Розріз часток листка за глибиною помірний. Середня кількість синусів краю листка. Рослина за положенням у просторі напівпряма. Черешок листка довгий, товстий. Потовщення основного кореня наявне. Корінь за довжиною довгий, середньої товщини, трикутної форми з помірним галуженням.

Маса коренеплоду - 90 г, товарний урожай - 6,8 т/га. Днів до достигання - 150, борошніста роса, % - 7, гниль біла, % - 7.

09163004 Алба

Заявник: Моравосід спол. с р.о.

Коренева петрушка. Рослина напівпряма, висока, широка з помірно щільною великою кількістю листків. Кучерявість листової пластинки відсутня, без загнутих часток догори. Листкова пластинка середня, помірно інтенсивності зеленого кольору. Листок за формою вузько-трикутний, з великою глибиною розрізу часток, середня кількість синусів краю. Черешок листка довгий, середньої товщини, антоціанове забарвлення відсутнє або дуже слабе. Потовщення основного кореня наявне. Корінь за довжиною середній, товстий, трикутної форми з слабким галуженням, гладкою білою поверхнею. Сорт призначений для свіжого споживання, зберігання, переробки. Рекомендовано для вирощування і на важких ґрунтах.

Маса коренеплоду - 135 г, борошніста роса, % - 11, гниль біла, % - 7. Днів до достигання - 150. Товарний урожай - 60 т/га.

Помідор їстівний

СЛП

СЛП