

## Степ, Лісостеп, Полісся

### 08040055 6 пунто 7 F1

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) від горизонтального до похилого, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість від помірної до сильної. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід за розміром від дуже маленького до середнього, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабкого до середнього. Розмір рубчика плодоніжки від дуже маленького до середнього. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід за твердістю від помірного до твердого, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 73 т/га; маса товарного плоду - 17 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,7%; вміст загального цукру - 3,2%; вміст вітаміну С - 16,2 мг%. Загальна кислотність - 0,35 %.

### 09040016 Адванс

Заявник: Ньюемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, широкий, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 95 т/га; маса товарного плоду - 90 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 80 днів; період плодоношення - 30 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 5,0%; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,2%. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,1%, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2%.

### 09040030 Асвон F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 75 т/га; маса товарного плоду - 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 50 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,8%.

### 09040052 Бейбіно F1

Заявник: СЕМО а.с.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною, від середнього до широкого за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

## Закритий ґрунт

## Закритий ґрунт

## Закритий ґрунт