

## Степ, Лісостеп, Полісся

### 08040055 6 пунто 7 F1

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) від горизонтального до похилого, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість від помірної до сильної. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід за розміром від дуже маленького до середнього, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабкого до середнього. Розмір рубчика плодоніжки від дуже маленького до середнього. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід за твердістю від помірної до твердої, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 73 т/га; маса товарного плоду - 17 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,7%; вміст загального цукру - 3,2%; вміст вітаміну С - 16,2 мг%. Загальна кислотність - 0,35 %.

### 09040016 Адванс

Заявник: Ньюемс Б.В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, широкий, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 95 т/га; маса товарного плоду - 90 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 80 днів; період плодоношення - 30 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 5,0%; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,2%. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,1%, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2%.

### 09040030 Асвон F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 75 т/га; маса товарного плоду - 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 50 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,8%.

### 09040052 Бейбіно F1

Заявник: СЕМО а.с.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною, від середнього до широкого за шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

## Закритий ґрунт

## Закритий ґрунт

## Закритий ґрунт

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 35 г; період від початку дозрівання - 50 днів; період плодоношення - 70 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру - 5,5 %; вміст вітаміну С - 22 мг%. Пошкодження шідниками: попелицею - 4,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 6,0 %, макроспоріозом - 6,0%, фітофторозом - 7,0 %.

### ® 06040039 Боярин

#### Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: округла; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: три-чотири; зелене плече плоду (перед дозріванням) : відсутнє; колір плоду за дозрівання: червоний; колір м'якоті плоду (за дозрівання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час дозрівання: помірне.

Загальна урожайність - 40 т/га; товарна урожайність 35 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 115 днів; період плодоношення - 65 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,8 %; вміст загального цукру, 4,5 %; дегустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 4,9, дегустаційна оцінка, балів : у переробці 4,9; транспортальність - 7 бали.

### ® 06040041 Бенефіс

#### Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: куста; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: чотири, п'ять або шість; зелене плече плоду (перед дозріванням) : відсутнє; колір плоду за дозрівання: червоний; колір м'якоті плоду (за дозрівання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час дозрівання: помірне.

Загальна урожайність - 35 т/га; товарна урожайність 33,3 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,4 %; вміст загального цукру, 3,3 %; дегустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 4,8, дегустаційна оцінка, балів : у переробці 4,4; транспортальність - 5 балів.

### 09040040 Бігдена F1

#### Закритий ґрунт

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість помірні. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий, плескато-округлої форми у повздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки сильне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед дозріванням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 610 т/га; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 120 днів; період плодоношення - 240 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%; вміст каротину - 30 мг%; вміст загального цукру - 3,5 %; вміст вітаміну С - 28 мг%. Загальна кислотність - 3%.

### 09040007 Бріксол F1

#### Закритий ґрунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість слабка, глянсуватість помірно виражена. Плід середнього розміру, у повздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 4-5, або 6-камерний. Плід за дозрівання