червоного забарвлення. Час цвітіння та достигання - ранній.

плодоношення - 30 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,8%; вміст каротину - 2,4 мг%; вміст загального цукру - 3,0 %; вміст вітаміну С - 27 Загальна урожайність - 8 кг/м2; маса товарного плоду - 75 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період мг%. Загальна кислотність - 0,7 %.

Закритий грунт

08040076 BII 1

Вілморін

округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, короткий, середній за шириною, двічі помірний.

плодоношення - 45 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 6,8 %; вміст вітаміну С - 18 Загальна урожайність - 8 кг/м2; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період

Закритий грунт

09040028 Вірта F1

ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть червона. Строк лежкості довгий. перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий за Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період Закритий грунт

09040032 Верон F1

плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,0%

ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватістьслабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 75 т/га; маса товарного плоду - 85 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,0%.

09040021 Грифон F1

округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер -425 перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, двічі

Закритий грунт

426 чотири, п'ять або шість. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст загального цукру - 3,2 %; вміст вітаміну С - 18 мг%; вміст каротину - 1,3 Загальна урожайність - 85 т/га; маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період мг%. Загальна кислотність - 0,8%. Закритий грунт

09040070 Гаяна F1

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескатоокруглої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер -Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі чотири, п'ять або шість. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7%; вміст загального цукру - 7 %; вміст каротину - 3 мг%; вміст вітаміну С - 18 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,3 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом -Загальна урожайність - 4 кг/м2; маса товарного плоду - 135 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період 0,1%, фітофторозом - 0,1 %. Степ, Лісостеп, Полісся

08040057 Enerpo F1

Монсанто Холланд Б.В.

округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер -Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, більше шести. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, пежкості помірний.

плодоношення - 37 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,7%; вміст загального цукру - 2,5-2,8 %; вміст вітаміну С - 13,5-16,2 мг%. Загальна Загальна урожайність - 135 т/га; маса товарного плоду - 190-230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період кислотність - 0,5%. Закритий грунт

09040033 Зута

ГОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, меленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) маленького розміру. Плід твердий, червоного кольору. двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчика плодоніжки М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 150 т/га; маса товарного плоду - 160 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 65 днів; період плодоношення - 75 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст загального цукру - 4,5 %.

09040020 Каліста F1

Закритий грунт