

чотири, п'ять або шість. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 85 т/га; маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст загального цукру - 3,2%; вміст вітаміну С - 18 мг%; вміст каротину - 1,3 мг%. Загальна кислотність - 0,8%.

09040070 Гаяна F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмБХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, гляснувуватий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 4 кг/м²; маса товарного плоду - 135 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7%; вміст загального цукру - 7%; вміст каротину - 3 мг%; вміст вітаміну С - 18 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1%. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,3%, гнилями - 0,2%, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,1%.

08040057 Елегро F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, гляснувуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 135 т/га; маса товарного плоду - 190-230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 37 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,7%; вміст загального цукру - 2,5-2,8%; вміст вітаміну С - 13,5-16,2 мг%. Загальна кислотність - 0,5%.

09040033 Зута

Заявник: ТОВ "Бізнес Стретеджи Девелопмент Україна"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та гляснувуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) маленького розміру. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 150 т/га; маса товарного плоду - 160 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 65 днів; період плодоношення - 75 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст загального цукру - 4,5%.

09040020 Каліста F1

Заявник: Хазера Генетікс

Закритий ґрунт

Степ, Лісостеп, Полісся

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід маленький, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 7,5 кг/м²; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,1%; вміст каротину - 3,3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 8,5 мг%. Загальна кислотність - 4,5%.

09040035 Карато

Заявник: ICI Сементі С.п.А.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, короткий, вузький, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 5,3 кг/м²; маса товарного плоду - 255 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 63 дні; період плодоношення - 20 днів; вміст сухої речовини в плоді - 9,0%; вміст каротину - 0,13 мг%; вміст загального цукру - 5,7 %; вміст вітаміну С - 0,17 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %.

09040038 Каріока

Заявник: ICI Сементі С.п.А.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід великий, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 5,4 кг/м²; маса товарного плоду - 257 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 63 днів; період плодоношення - 18 днів; вміст сухої речовини в плоді - 8,5%; вміст каротину - 0,17 мг%; вміст загального цукру - 6,7 %; вміст вітаміну С - 0,2 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %. Загальна кислотність - 2,3 %.

09040066 Каракас F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмБХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід дуже твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 4 кг/м²; маса товарного плоду - 125 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 2 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 20

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт