

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід маленький, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 7,5 кг/м²; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,1%; вміст каротину - 3,3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 8,5 мг%. Загальна кислотність - 4,5%.

09040035 Карато

Заявник: ІСІ Сementі С.п.А.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, короткий, вузький, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 5,3 кг/м²; маса товарного плоду - 255 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 63 дні; період плодоношення - 20 днів; вміст сухої речовини в плоді - 9,0%; вміст каротину - 0,13 мг%; вміст загального цукру - 5,7 %; вміст вітаміну С - 0,17 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %.

09040038 Каріюка

Заявник: ІСІ Сementі С.п.А.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість та глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід великий, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 5,4 кг/м²; маса товарного плоду - 257 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 63 днів; період плодоношення - 18 днів; вміст сухої речовини в плоді - 8,5%; вміст каротину - 0,17 мг%; вміст загального цукру - 6,7 %; вміст вітаміну С - 0,2 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %. Загальна кислотність - 2,3 %.

09040066 Каракас F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмБХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід дуже твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 4 кг/м²; маса товарного плоду - 125 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 2 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 20

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт

Закритий ґрунт