

мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2 %.

09040067 Кларабелла F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, гляснуватий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід помірний за твердістю, рожевого кольору. М'якість помірний.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м²; маса товарного плоду - 130 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 19 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,3 %, макроспоріозом - 0,2%, фітофторозом - 0,2 %.

09040027 Касаморі F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, гляснуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед досяганням) мале. Плід помірний за твердістю, рожевого кольору. М'якість рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 60 т/га; маса товарного плоду - 230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%.

09040068 Куерідо F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та гляснуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якість рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 4 кг/м²; маса товарного плоду - 130 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 18 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,3 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,1 %.

09040037 Лідер F1

Заявник: ICI Сементі С.п.А.

Закритий ґрунт

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, короткий, вузький, перистий, пухирчастість та гляснуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід дуже маленький, кутастої форми у поздовжньому