

мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2 %.

09040067 Кларабелла F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, гляснуватий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід помірний за твердістю, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м²; маса товарного плоду - 130 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 19 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,3 %, макроспоріозом - 0,2%, фітофторозом - 0,2 %.

09040027 Касаморі F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, гляснуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед досяганням) мале. Плід помірний за твердістю, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 60 т/га; маса товарного плоду - 230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%.

09040068 Куерідо F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та гляснуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 4 кг/м²; маса товарного плоду - 130 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 18 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,3 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,1 %.

09040037 Лідер F1

Заявник: ICI Сементі С.п.А.

Закритий ґрунт

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, короткий, вузький, перистий, пухирчастість та гляснуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід дуже маленький, кутастої форми у поздовжньому

розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості дуже довгий.

Загальна урожайність - 5,5 кг/м²; маса товарного плоду - 250 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 60 днів; період плодоношення - 18 днів; вміст сухої речовини в плоді - 8,0%; вміст каротину - 0,15 мг%; вміст загального цукру - 4,7 %; вміст вітаміну С - 0,15 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0%, фітофторозом - 5,0 %. Загальна кислотність - 3,3 %.

Закритий ґрунт

08040034 Лорелі F1

Заявник: Клоз

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, за довжиною від довгого до дуже довгого, дуже широкий, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - більше шести. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст каротину - 2,1 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0%, фітофторозом - 2,0 %.

Закритий ґрунт

08040028 Ліона F1

Заявник: Клоз

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, за довжиною від середнього до довгого, за шириною від середнього до широкого, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабкого до слабкого. Розмір рубчика плодоніжки від дуже маленького до маленького. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід за твердістю від помірного до твердого, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 6,5 кг/м²; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 75 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст сухої речовини в соку - 6,0%; вміст каротину - 2 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0%, фітофторозом - 2,0 %.

Закритий ґрунт

09040069 Леванцо F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м²; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 85 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7,0%; вміст каротину - 2 мг%; вміст вітаміну С - 20 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,3 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1%, фітофторозом - 0,2 %.