

Заявник:

Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість помірна, глясуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - три-чотири. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м²; маса товарного плоду - 130 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 75 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст каротину - 2 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 7,0%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 20 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,1 %, фітофторозом - 0,2 %.

09040036 Міленіум F1

Заявник:

ICI Сементі С.п.А.

Закритий ґрунт

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, короткий, вузький, перистий, пухирчастість та глясуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід дуже маленький, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) наявне. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості дуже довгий.

Загальна урожайність - 5 кг/м²; маса товарного плоду - 280 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 65 днів; період плодоношення - 15 днів; вміст сухої речовини в плоді - 8,0%; вміст каротину - 0,12 мг%; вміст загального цукру - 4,7 %; вміст вітаміну С - 0,1 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 5,0 %, макроспоріозом - 5,0 %, фітофторозом - 5,0 %. Загальна кислотність - 3,35 %.

08040029 Муна F1

Заявник:

Клоз

Закритий ґрунт

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глясуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабкого до слабкого. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 5,5 кг/м²; маса товарного плоду - 95 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст сухої речовини в соку - 6,0%; вміст каротину - 2,1 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0 %, фітофторозом - 2,0 %.

08040059 Мірсіні F1

Заявник:

Монсанта Холланд Б.В.

Полісія, Лісостеп, Степ

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глясуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за

розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плоніжки помірне. Розмір рубчика плоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 120 т/га; маса товарного плоду - 210-230 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 115 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,5%; вміст загального цукру - 2,3-2,6 %; вміст загального цукру С - 13,5-16,5 мг%. Загальна кислотність - 0,5%.

09040029 Магали F1

Заявник: ТОВ "Бізнес Стратеджи Девелопмент Україна"

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною, широкий, перистий, пухирчастість та глясுவатість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плоніжки слабе. Розмір рубчика плоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 85 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 60 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,5%.

® 08040020 Ната F1

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слаба, глясுவатість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід великий, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плоніжки слабе. Розмір рубчика плоніжки меленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 32,8 т/га; маса товарного плоду - 160 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 96 днів; період плодоношення - 182 дні; вміст сухої речовини в плоді - 5,8%; вміст каротину - 0,41 мг%; вміст загального цукру - 3,4 %; вміст вітаміну С - 21,2 мг%.

09040065 Нергал F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та глясுவатість слаба. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плоніжки слабе. Розмір рубчика плоніжки великий. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м²; маса товарного плоду - 145 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 40 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7,0%; вміст каротину - 3 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 19 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0,1 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 0,5 %, гнилями - 0,2 %, макроспоріозом - 0,2%, фітофторозом - 0,1 %.

® 08040019 Окраса F1

Закритий ґрунт