

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 18,6 т/га; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 76 днів; період плодоношення - 83 дні; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст каротину - 0,44 мг%; вміст загального цукру - 3,8 %; вміст вітаміну С - 20,9 мг%.

09040077 Полсет F1

Заявник:

Бейо Заден Б.В.

Закритий ґрунт

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід м'який, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 20,2 кг/м²; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 20 днів; вміст каротину - 2,5 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст загального цукру - 5,1 %; вміст вітаміну С - 21,7 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 7 %, гнилями - 7 %, макроспоріозом - 8 %, фітофторозом - 9 %.

09040051 Парто F1

Заявник:

СЕМО а.с.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, від середнього до широкого за шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід за розміром від середнього до великого, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки від середнього до великого. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості від помірного до довгого.

Загальна урожайність - 100 т/га; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 55 днів; період плодоношення - 70 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,9%; вміст загального цукру - 3,8 %; вміст вітаміну С - 17,1 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 6,0 %, макроспоріозом - 7,0 %, фітофторозом - 7,0 %.

08040031 Посадас F1

Заявник:

Клоз

Закритий ґрунт

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянсуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабого до слабого. Розмір рубчика плодоніжки від маленького до дуже маленького. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід за твердістю від помірного до твердого, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.