

Вид: Баклажан *Solanum melongena* L.

Заявка № 17093002 Назва сорту: Мадалена **Заявник (код):** 2277 **Власник сорту (код):** 2277

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила | відсутнє | 1 |
| 2 | Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила | ознака не визначається | 0 |
| 3 | Рослина: габітус | прямостоячий | 1 |
| 4 | Рослина: за висотою | висока | 7 |
| 5 | Рослина: стебло за довжиною (від сім'ядолей до вузла до 1-ої квітки) | довге | 7 |
| 6 | Стебло: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 7 | Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 8 | Стебло: опушення | помірне | 5 |
| 9 | Листкова пластинка: розмір | великий | 7 |
| 10 | Листкова пластинка: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 11 | Листкова пластинка: пухирчастість | слабка | 3 |
| 12 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 7 |
| 13 | Суцвіття: кількість квіток | від одної до трьох | 1 |
| 14 | Квітка: розмір | великий | 7 |
| 15 | Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення | сильна | 7 |
| 16 | Плід: за довжиною | довгий | 7 |
| 17 | Плід: максимальний діаметр | середній | 5 |
| 18 | Плід: відношення довжина/діаметр | середнє | 5 |
| 19 | Плід: основна форма | булавоподібна | 5 |
| 20 | Плід: розмір рубця маточки | малий | 3 |
| 21 | Плід: верхівка | округла | 3 |
| 22 | Плід: виїмка рубця приймочки маточки за глибиною | мілка | 3 |
| 23 | Лише для сортів з циліндричною формою плодів. Плід: вигин | ознака не визначається | 0 |
| 24 | Плід: забарвлення шкірки в збиральній стиглості | фіолетове | 3 |
| 25 | Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24) | сильна | 7 |
| 26 | Плід: глянуватість (як для 24) | сильна | 7 |
| 27 | Плід: плямистість | відсутня | 1 |
| 28 | Плід: смугастість | відсутня | 1 |
| 29 | Плід: помітність смуг | ознака не визначається | 0 |
| 30 | Плід: щільність смуг | ознака не визначається | 0 |
| 31 | Плід: ребристість | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 32 | Плід: квітконіжка за довжиною | довга | 7 |
| 33 | Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою | відсутнє | 1 |
| 34 | Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою | ознака не визначається | 0 |
| 35 | Плід: розмір чашечки | середній | 5 |
| 36 | Плід: антоціанове забарвлення чашечки | відсутнє | 1 |
| 37 | Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки | ознака не визначається | 0 |
| 38 | Плід: шипуватість чашечки | помірна | 5 |
| 39 | Плід: зморшкуватість чашечки | помірна | 5 |
| 40 | Плід: забарвлення м'якоті | білувате | 1 |
| 41 | Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості | коричневе | 4 |
| 42 | Час початку цвітіння | ранній | 3 |
| 43 | Час фізіологічної стиглості | ранній | 3 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 310. Період від сівби до початку досягання, дів – 92. Період плодоношення, дів – 210. Вміст сухої речовини в плодах, % – 8,5. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): попелиці (*Aphidinea*) – 7. Стійкість проти хвороб, бал (1–9): вірусні хвороби (*Pseudomonas solanacearum* (Sm.) Berg.; *Fusarium* sp.; *Verticillium albo-atrum* Reincke et Berthold) – 8, гнилі (*Phomopsis vexans* Hart.; *Botrytis cinerea* Pers.; *Sclerotium Rolfsii* Sacc.) – 8, макроспоріоз (*Macrosporium solani* Ell. et Mart.) – 7, фітофтороз (*Phytophthora infestans* D.B.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.