

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) піднесений, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 18,6 т/га; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 76 днів; період плодоношення - 83 дні; вміст сухої речовини в плоді - 4,8%; вміст каротину - 0,44 мг%; вміст загального цукру - 3,8 %; вміст вітаміну С - 20,9 мг%.

09040077 Полсет F1

Заявник:

Бейо Заден Б.В.

Закритий ґрунт

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Плід м'який, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 20,2 кг/м²; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плодоношення - 20 днів; вміст каротину - 2,5 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст загального цукру - 5,1 %; вміст вітаміну С - 21,7 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 7 %, гнилями - 7 %, макроспоріозом - 8 %, фітофторозом - 9 %.

09040051 Парто F1

Заявник:

СЕМО а.с.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною, від середнього до широкого за шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід за розміром від середнього до великого, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки від середнього до великого. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості від помірного до довгого.

Загальна урожайність - 100 т/га; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 55 днів; період плодоношення - 70 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,9%; вміст загального цукру - 3,8 %; вміст вітаміну С - 17,1 мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 5,0 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 5,0 %, гнилями - 6,0 %, макроспоріозом - 7,0 %, фітофторозом - 7,0 %.

08040031 Посадас F1

Заявник:

Клоз

Закритий ґрунт

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість слабка, глянуватість дуже слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, яйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки від дуже слабого до слабого. Розмір рубчика плодоніжки від маленького до дуже маленького. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід за твердістю від помірного до твердого, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 3,5 кг/м²; маса товарного плоду - 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 65 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст каротину - 2 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%, вміст сухої речовини в соку - 6 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0%, фітофторозом - 2,0 %.

06040053 Полфаст F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: циліндрична; за товщиною перикарду плоду: тонкий; кількість камер: дві-три; зелене плече плоду (перед дозріванням) : відсутнє; колір плоду за дозрівання: червоний; колір м'якоті плоду (за дозрівання): червоний; строк лежкості плоду: довгий; час дозрівання: помірно.

Група стиглості - ранньостиглий. Загальна урожайність - 100 т/га; товарна урожайність 90 т/га; маса товарного плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 50 днів; період плодоношення - 45 днів; деугустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 9, деугустаційна оцінка, балів : у переробці 9.

06040018 Пілмек

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: куста; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: чотири, п'ять або шість; зелене плече плоду (перед дозріванням) : відсутнє; колір плоду за дозрівання: червоний; колір м'якоті плоду (за дозрівання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час дозрівання: помірно.

Загальна урожайність - 55 т/га; маса товарного плоду - 70 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; дружність визрівання - 70 %; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; вміст загального цукру - 5,1 %; транспортабельність - 7 балів;

08040064 Рапіт F1

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у повздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед дозріванням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 100 т/га; маса товарного плоду - 60 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 27 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,0-4,1 %; вміст загального цукру - 2,3-2,6 %; вміст вітаміну С - 13,5-16,2 мг%; загальна кислотність - 0,5 %.

09040013 Саргон F1

Заявник: Агро-Тіп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, кустастої форми у повздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед дозріванням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Степ

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп