

Загальна урожайність - 3,5 кг/м²; маса товарного плоду - 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 65 днів; період плодоношення - 45 днів; вміст каротину - 2 мг%; вміст загального цукру - 6,0 %; вміст вітаміну С - 21 мг%, вміст сухої речовини в соку - 6 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 1,5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 1,0 %, гнилями - 1,3 %, макроспоріозом - 3,0%, фітофторозом - 2,0 %.

06040053 Полфаст F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: циліндрична; за товщиною перикарду плоду: тонкий; кількість камер: дві-три; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: довгий; час достигання: помірно.

Група стиглості - ранньостиглий. Загальна урожайність - 100 т/га; товарна урожайність плоду - 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 50 днів; період плодоношення - 45 днів; деугустаційна оцінка, балів : свіжих плодів 9, деугустаційна оцінка, балів : у переробці 9.

06040018 Пілмек

Заявник: Харріс Моран Сідс Компані

Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: куста; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: чотири, п'ять або шість; зелене плече плоду (перед достиганням) : відсутнє; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 55 т/га; маса товарного плоду - 70 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 90 днів; дружність визрівання - 70 %; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; вміст загального цукру - 5,1 %; траспортбельність - 7 балів;

08040064 Рапіт F1

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у повздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 100 т/га; маса товарного плоду - 60 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 105 днів; період плодоношення - 27 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,0-4,1 %; вміст загального цукру - 2,3-2,6 %; вміст вітаміну С - 13,5-16,2 мг%; загальна кислотність - 0,5 %.

09040013 Саргон F1

Заявник: Агро-Тіп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, перистий, пухирчастість слабка, глянуватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, кустастої форми у повздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірно. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Степ

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 160 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 98 днів; період плодоношення - 115 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру - 6,0%; вміст вітаміну С - 100 мг/100 г, вміст каротину - 5 мг/г. Загальна кислотність - 40%. Пошкодження шкідниками: попелицею - <5%. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - <5%, гнилями - <5%, макроспориозом - <5%, фітофторозом - <5%.

09040047 Т 47110 F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, широкий, перистий, пухирчастість та глянсுவатість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки помірне. Розмір рубчика плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 510 т/га; маса товарного плоду - 95 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 120 днів; період плодоношення - 240 днів; вміст каротину - 30 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 6,5%; вміст загального цукру - 3,5%; вміст вітаміну С - 25 мг%. Загальна кислотність - 4,0%. Ураженість хворобами: макроспориозом - 10%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 10%.

® 09040019 Таша F1

Заявник: Хазера Генетікс

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, двічі перистий, пухирчастість та глянсுவатість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід маленький, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки дуже маленький. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 8 кг/м²; маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 100 днів; період плодоношення - 35 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 7,0%; вміст вітаміну С - 17,5 мг%. Загальна кислотність - 4,5%.

09040048 Тіраде Пінк F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Закритий ґрунт

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за довжиною, широкий, двічі перистий, пухирчастість та глянсுவатість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід дуже великий, округлої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки сильне. Розмір рубчика плодоніжки великий. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, рожевого кольору. М'якоть рожева. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 610 т/га; маса товарного плоду - 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 130 днів; період плодоношення - 210 днів; вміст сухої речовини в плоді - 7,5%; вміст каротину - 30 мг%; вміст загального цукру - 5,5%; вміст вітаміну С - 30 мг%. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 10,0%, гнилями - 10,0%, макроспориозом - 10,0%, фітофторозом - 10,0%.

09040011 Торрос F1

Заявник: Агро-Тіп

Лісостеп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, двічі перистий, пухирчастість та глянсுவатість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки відсутній. Плід середній за розміром,