

еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плоніжки відсутнє або дуже слабке. Розмір рубчика плоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 100 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плонішення - 95 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; вміст загального цукру - 5,8 %; вміст вітаміну С - 160 мг/100 г; вміст каротину - 5 мг/г. Загальна кислотність - 40%. Пошкодження шкідниками: попелицею - <5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - <5 %, гнилями - <5 %, макроспоріозом - <5%, фітофторозом - <5 %.

## ® 07040007 Тайм

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук. Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у поздовжньому розрізі плоду: округла; за товщиною перикарду плоду: середній; кількість камер: три-чотири; зелене плече плоду (перед достиганням) : наявне; колір плоду за достигання: червоний; колір м'якоті плоду (за достигання): червоний; строк лежкості плоду: помірний; час достигання: рано.

Загальна урожайність - 65 т/га; маса товарного плоду - 80 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 108 днів; період плонішення - 45 днів; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 4,5; вміст сухої речовини в плоді - 5,7%; вміст загального цукру - 3,6 %; вміст вітаміну С - 22,6 мг%;

## 09040076 Тойото F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глясуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, оберненояйцевидної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плоніжки слабе. Розмір рубчика плоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 24 кг/м<sup>2</sup>; маса товарного плоду - 140 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 70 днів; період плонішення - 20 днів; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст сухої речовини в плоді - 6,0%; вміст загального цукру - 5,3 %; вміст вітаміну С - 22,3мг%. Пошкодження шкідниками: попелицею - 7 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - 7 %, гнилями - 7 %, макроспоріозом - 8%, фітофторозом - 9 %.

## 09040014 Темис F1

Заявник: Агро-Тіп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, двічі перистий, пухирчастість та глясуватість слабка. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, кутастої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плоніжки слабе. Розмір рубчика плоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 100 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плонішення - 110 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,2%; вміст загального цукру - 5,3 %; вміст вітаміну С - 100 мг/100 г; вміст каротину - 5 мг/г. Загальна кислотність - 40%. Пошкодження шкідниками: попелицею - <5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - <5 %, гнилями - <5 %, макроспоріозом - <5%, фітофторозом - <5 %.

## Лісостеп, Степ

## Закритий ґрунт

## Лісостеп