

Заявник: Агро-Тіп

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середній за шириною та довжиною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глясуюватість сильна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, еліптичної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабе. Розмір рубчика плодоніжки меленький. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Загальна урожайність - 80 т/га; маса товарного плоду - 84 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 95 днів; період плодоношення - 110 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,8%; вміст загального цукру - 5,2 %; вміст вітаміну С - 100мг/100 г; вміст каротину - 5 мг/г. Загальна кислотність - 40%. Пошкодження шкідниками: попелицею - <5 %. Ураженість хворобами: вірусними хворобами - <5 %, гнилями - <5 %, макроспоріозом - <5%, фітофторозом - <5 %.

® 09040018 Шанті F1

Закритий ґрунт

Заявник: Хазера Генетікс

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середній за довжиною та шириною, перистий, пухирчастість слабка, глясуюватість помірна. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром, оберненояйцеподібної форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки відсутнє або дуже слабе. Розмір рубчика плодоніжки дуже меленький. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед достиганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний.

Загальна урожайність - 8 кг/м²; маса товарного плоду - 180 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 110 днів; період плодоношення - 85 днів; вміст сухої речовини в плоді - 6,1%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 7,0 %; вміст вітаміну С - 17,5 мг%. Загальна кислотність - 4,5 %.

05040083 Шахтарський

Лісостеп, Степ

Заявник: Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Тип розвитку рослини: детермінантний; форма у повздовжньому розрізі плоду: серцевидна; за товщиною перикарду плоду: тонкий; кількість камер: чотири, п'ять або шість; зелене плече плоду (перед достиганням) : наявне; колір плоду за достигання: рожевий; колір м'якоті плоду (за достигання): рожевий; строк лежкості плоду: короткий; час достигання: помірно.

Загальна урожайність - 36,8 т/га; товарна урожайність 15,6 т/га; маса товарного плоду - 106 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 47 днів; вміст сухої речовини в плоді - 4,14%; вміст загального цукру - 23,56 %, дегустайна оцінка, балів : свіжих плодів 4,5.

09040004 Юджі 8168 F1

Закритий ґрунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Гібрид детермінантного типу розвитку. Листки короткі, середні за шириною, пухирчастість та глясуюватість помірно виражені. Плід середнього розміру, у поздовжньому розрізі округлої форми з товстим перикарпом, 4-5, або 6-камерний. Плід за достигання рожевого забарвлення. Час цвітіння та достигання - ранній.

Загальна урожайність - 7,3 кг/м²; маса товарного плоду - 90 г; період від повних сходів до початку дозрівання - 112 днів; період плодоношення - 29 днів; вміст сухої речовини в плоді - 5,6%; вміст каротину - 2,3 мг%; вміст загального цукру - 3,2 %; вміст вітаміну С - 26 мг%. Загальна кислотність - 0,5 %.