

### **08291010 Красуничк**

Заявник:

Київська дослідна станція Інституту овочевництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-широколіптичної форми, пухирчастість помірна. Глянсуватість з верхнього боку помірна. Хвилястість краю дуже сильна. Антоціанове забарвлення на листках наявне, інтенсивність сильна. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 218 ц/га; днів до досягнення - 38.

### **08291006 Мулті**

Заявник:

Нюнеміс Б.В.

Насіння чорне. Рослина маленька за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-широколіптичної форми, пухирчастість від дуже слабкої до слабкої. Глянсуватість з верхнього боку від помірної до сильної. Хвилястість краю помірна, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості від ранньої до середньої.

Товарний урожай 500 ц/га; днів до досягнення - 35.

### **® 08291008 Онікс**

Заявник:

Нюнеміс Б.В.

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-булькоеліптичної форми, пухирчастість від помірної до сильної. Глянсуватість з верхнього боку від слабкої до помірної. Хвилястість краю дуже сильна, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості від ранньої до середньої.

Товарний урожай 400 ц/га; днів до досягнення - 40.

### **09291007 Сільвінас**

Заявник:

Рік Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широколіптичної форми, пухирчастість помірна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 210 ц/га; днів до досягнення - 70. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

## **Цибуля городня**

### **Степ**

### **07041011 Скаліно F1**

Заявник:

Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; положення листя: напівпрямі; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий напіт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулиники (з сухою шкіркою навколо кожної цибулиники): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна