

Товарний урожай 400 ц/га; днів до досягання - 45.

442

## 08291010 Красунчик

Заявник: Київська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Глянсуватість з верхнього боку помірна. Хвилястість краю дуже сильна. Антоціанове забарвлення на листках наявне, інтенсивність сильна. Час збиральної стиглості середній.

Товарний урожай 218 ц/га; днів до досягання - 38.

## 08291006 Мульти

Заявник: Ньюемс Б.В.

Насіння чорне. Рослина маленька за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість від дуже слабкої до слабкої. Глянсуватість з верхнього боку від помірної до сильної. Хвилястість краю помірна, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості від ранньої до середньої.

Товарний урожай 500 ц/га; днів до досягання - 35.

## ® 08291008 Онікс

Заявник: Ньюемс Б.В.

Насіння біле. Рослина середня за діаметром, не утворює головки. Листки обернено-вузькоеліптичної форми, пухирчастість від помірної до сильної. Глянсуватість з верхнього боку від слабкої до помірної. Хвилястість краю дуже сильна, розсіченість краю верхівки наявна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Час збиральної стиглості від ранньої до середньої.

Товарний урожай 400 ц/га; днів до досягання - 40.

## 09291007 Сільвінас

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Насіння чорне. Рослина велика за діаметром, головка закрита, щільна, велика за розміром, широкоеліптичної форми у поздовжньому перерізі. Листки обернено-широкоеліптичної форми, пухирчастість помірна. Антоціанове забарвлення на листках відсутнє. Помірна хвилястість краю листка. Час збиральної стиглості пізній.

Товарний урожай 210 ц/га; днів до досягання - 70. Ураження хворобами: несправжня борошниста роса 0,2 %.

## 07041011 Скапіно F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки ( з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна

## Цибуля городня

Степ

форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 75, Вегетаційний період, днів 108, Вміст : сухої речовини в плоді, % 12, Вміст :загального цукру, % 9,3, Вміст : вітаміну С, мг% 10,8.

## 07041012 Аренал F1

### Полісся, Лісостеп

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки ( з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): яйцевидна; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 80, Вегетаційний період, днів 130, Вміст : сухої речовини в плоді, % 13,5, Вміст :загального цукру, % 9,8, Вміст : вітаміну С, мг% 10,5

## ® 07041015 Алтана

### Степ, Лісостеп, Полісся, Закритий ґрунт

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: слабкий; розщеплення цибулини на цибулинки ( з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: жовтий.

Загальна урожайність, т/га 36, Вегетаційний період, днів 115, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 10, Ураженість хворобами, % : гнилями 1, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 18, Вміст :загального цукру, % 11, Вміст : вітаміну С, мг% 9

## 08041031 Антилопа F1

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середній. Цибулина середнього розміру, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка товста, рожевого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 67,0-70,0 т/га, вегетаційний період 115 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 7,3-9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,6. Вміст загального цукру, % - 5,9-6,2.

## ® 05041008 Булат

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"