

форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 75, Вегетаційний період, днів 108, Вміст : сухої речовини в плоді, % 12, Вміст :загального цукру, % 9,3, Вміст : вітаміну С, мг% 10,8.

## 07041012 Аренал F1

### Полісся, Лісостеп

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки ( з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): яйцевидна; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 80, Вегетаційний період, днів 130, Вміст : сухої речовини в плоді, % 13,5, Вміст :загального цукру, % 9,8, Вміст : вітаміну С, мг% 10,5

## ® 07041015 Алтана

### Степ, Лісостеп, Полісся, Закритий ґрунт

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: слабкий; розщеплення цибулини на цибулинки ( з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: жовтий.

Загальна урожайність, т/га 36, Вегетаційний період, днів 115, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 10, Ураженість хворобами, % : гнилями 1, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 18, Вміст :загального цукру, % 11, Вміст : вітаміну С, мг% 9

## 08041031 Антилопа F1

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середній. Цибулина середнього розміру, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка товста, рожевого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 67,0-70,0 т/га, вегетаційний період 115 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 7,3-9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,6. Вміст загального цукру, % - 5,9-6,2.

## ® 05041008 Булат

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"